

बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया र नेपालमा हालसम्म^१ उन्मोचित तथा पञ्जिकृत विभिन्न बालीका जातहरू

आ.ब.: २०७६/७७

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय
बीउ विजन प्रयोगशाला,
सुन्दरपुर, कञ्चनपुर



सम्पर्क नं.: ९८४८४७७४७७, ९८४८७०७६७९, ९८४८८४९६६७

ईमेल: rstlsnp@gmail.com

फेसबुक पेज: बीउ विजन प्रयोगशाला सुन्दरपुर

खण्ड : १

बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण तथा बीउ
प्रमाणीकरण प्रक्रिया

मुख्य ऐन, नीति तथा नियमावली

नेपालमा बीउ विजन सम्बन्धी मुख्य ऐन, नीति, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

- बीउ विजन ऐन, २०४५
- बीउ विजन नीती, २०५६
- बीउ विजन नियमावली, २०६९
- बीउ विजन प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०७४
- बीउ विजन परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन निर्देशिका, २०७४
- बीउ विजन परीक्षण निर्देशिका, २०७४
- बीउ विजनको नमुना संकलन गर्ने कार्यविधि, २०७३

माथि उल्लेखित ऐन, नीति, नियमावली तथा कार्यविधिहरु एवं बीउ विजनसँग सम्बन्धीत अन्य नियम कानुनहरु बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको वेभसाइट : www.sqcc.gov.np मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा दुई पद्धतिबाट बीउको गुणस्तर निर्धारण गरिन्छ :


१. बीउ प्रमाणीकरण पद्धति :

- यो सरकारी स्तरबाट गरिने पद्धति हो ।
- कुनै बालीको सिफारिस जातको बीउ उत्पादन तथा त्यस उप्रान्तका कृयाकलापमा आवश्यक रोहवर र निगरानी राख्दै बीउको गुणस्तरीयताको सुनिश्चीत गर्नको लागि अपनाइने कार्य प्रणाली हो ।
- यसमा बीउ गुण नियन्त्रण निकायले श्रोत बीउ, खडाबाली निरीक्षण, बीउ वाली खलियान, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण आदिको निरीक्षण गरी तयारी बीउको नमुना जाँच गर्दछ र गुणस्तरको हदभित्र रहेको वित लटका हरेक वोराहरुमा निसाना सहितको संकेतपत्र राखी सिलबन्धी गरिन्छ ।

२. यथार्थ संकेतपत्र पद्धति:

- बीउ विजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन, २०६४) ले बीउ प्रमाणीकरणलाई स्वेच्छामा छाडेको छ, भने यथार्थ संकेतपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ ।
- यस प्रक्रियामा बीउ प्रमाणीकरण निकायबाट प्राविधिक निरीक्षण गरिदैन । बीउ उत्पादक वा बीउ विक्रेताले बीउको गुणस्तर नियन्त्रणका सबै काम आफै गर्नु पर्दछ र गुणस्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।
- यस किसिमबाट उत्पादन गरिएको बीउको थैलोमा यथार्थ संकेत पत्र लगाएको हुनु पर्छ । यथार्थ संकेतपत्र पहेलो रंगको कागजमा कालो अक्षरले लेखेको हुनु पर्दछ ।
- न्युनतम स्तरभन्दा कम गुणस्तरको बीउ विजन विक्री वितरण गरेको खण्डमा बीउ विजन ऐन र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम सजाय हुन सक्छ ।
- यथार्थ संकेतपत्रको लम्बाई १३. ५ से.मी. र चौडाई ८.५ से.मी. को हुनुपर्छ ।

प्रमाणीकरण र यथार्थ संकेतपत्र पद्धतिमा बीउका स्तर र द्यागको रङ्ग



प्रमाणीकरण पद्धतिमा बीउका स्तर अनुसार लगाईने द्याग

प्रजनन् बीउ	
द्याग नं: _____	बाली: _____
लट नं: _____	जात: _____
उत्पादन वर्ष: _____	सिफारिश गरिएको क्षेत्र: _____
बीउको गुणस्तर:	बीउ प्रमाणीकरण मिति: _____
शुद्ध बीउ: _____ %	
चिम्बाना: _____ %	
बीउको तौल:	
बीउ उपचार गरेको भए विचारीको नाम र दर: _____	
बीउ उत्पादन गर्ने वा निस्ता लगाउने संस्थाको नाम:	ठेगाना:
प्रजनको नाम:	पद:
हस्ताक्षर:	मिति:
बीउ उत्पादन गर्ने संस्थाको छाप:	
सुरक्षित साथ भण्डारण गरेमा यो बीउ प्रमाणीकरणको न्याय विवरण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ। बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उभयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म न्याय विवरण गर्न सकिन्छ।	

प्रजनन बीउ

- समितिले प्रमाणित गर्ने र प्रजनकले द्याग लगाउने

मूल बीउ	
द्याग नं: _____	बाली: _____
लट नं: _____	जात: _____
उत्पादन वर्ष: _____	सिफारिश गरिएको क्षेत्र: _____
बीउको न्यूनस्तर	बीउ परीक्षण मिति: _____
शुद्ध बीउ (कम्तीमा): _____ %	उत्पादक (कम्तीमा): _____ %
चिम्बाना (बढीमा): _____ %	अन्य बालीको बीउ / केजी (बढीमा): _____
तौल:	पहिचानया आउनसक्त बेजातको बीउ / केजी (बढीमा): _____
बीउ उपचार गरेको भए विचारीको नाम र दर: _____	
बीउ उत्पादन गर्ने को:	बीउ प्रमाणीकरण गर्ने को:
नाम:	दस्तावेज़:
ठेगाना:	नाम:
हाप वा लोगो:	व्यारालय:
	मिति:
सुरक्षित साथ भण्डारण गरेमा यो बीउ प्रमाणीकरणको न्याय विवरण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ। बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उभयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म न्याय विवरण गर्न सकिन्छ।	

मूल बीउ

- प्राविधिकद्वारा प्रमाणित गरिने र बी.वि.गु.नि.के. वा बी.वि.प्रयोगशालाका अधिकृतद्वारा द्याग लगाइने

प्रमाणित बीउ

बाली:
 दर्याग नं.: लट नं.: उत्पादन वर्ष:

बीउको न्यूस्टर स्तर
गुद बीउ (कम्तीमा): %
विस्तार (वडीमा): %
तोल:

बीउ उपचार गरेको भए विधायीको नाम र दर:
बीउ प्रमाणिकरण गर्नेको:
 नाम: दर्सनवत: ठेगाना: नाम: कार्यालय: निविल:

नुरखित साथ भएकारण गरेमा यो बीउ प्रमाणिकरणको म्याद परीक्षण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ ।
 बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उपयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

उन्नत बीउ

बाली:
 जात: लट नं.: उत्पादन वर्ष:

सिफारिश गरिएको क्षेत्र:
 बीउ परीक्षण मिति:

बीउको न्यूस्टर
गुद बीउ (कम्तीमा): %
विस्तार (वडीमा): %
तोल:

बीउ उपचार गरेको भए विधायीको नाम र दर:
बीउ प्राविधिकको:
 नाम: दर्सनवत: ठेगाना: नाम: कार्यालय: निविल:

नुरखित साथ भएकारण गरेमा यो बीउ प्रमाणिकरणको म्याद परीक्षण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ ।
 बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उपयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

प्रमाणित बीउ

- प्राविधिकद्वारा प्रमाणित गरिने र बी.वि.गु.नि.के. वा बी.वि.प्रयोगशालाका अधिकृतद्वारा ट्याग लगाइने

उन्नत बीउ

- यथार्थ संकेतपत्र लगाइने र अनिवार्य गरिएको । बीउ उत्पादक स्वयंले लगाउने र साइज 13.5×6.5 से.मी. हुनुपर्ने

यथार्थ संकेतपत्र पद्धतिमा बीउका स्तर अनुसार लगाईने द्र्याग

श्रोत बीउ

बाली:
 दर्याग नं.: लट नं.: उत्पादन वर्ष:

बीउको न्यूस्टर
गुद बीउ (कम्तीमा): %
विस्तार (वडीमा): %
तोल:

बीउ उपचार गरेको भए विधायीको नाम र दर:
बीउ प्राविधिकको:
 नाम: दर्सनवत: ठेगाना: नाम: कार्यालय: निविल:

नुरखित साथ भएकारण गरेमा यो बीउ प्रमाणिकरणको म्याद परीक्षण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ ।
 बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उपयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

लेवल बीउ

बाली:
 जात: लट नं.: उत्पादन वर्ष:

सिफारिश गरिएको क्षेत्र:
 बीउ परीक्षण मिति:

बीउको न्यूस्टर
गुद बीउ (कम्तीमा): %
विस्तार (वडीमा): %
तोल:

बीउ उपचार गरेको भए विधायीको नाम र दर:
बीउ प्राविधिकको:
 नाम: दर्सनवत: ठेगाना: नाम: कार्यालय: निविल:

नुरखित साथ भएकारण गरेमा यो बीउ प्रमाणिकरणको म्याद परीक्षण गरेको मितिवाट ६ महिनासम्म रहनेछ ।
 बीउको पुनः परीक्षण गर्ने गुणस्तर उपयुक्त पाइएमा पुनः ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

श्रोत बीउ

- अनिवार्य गरिएको र बीउ उत्पादन स्वयंले लगाउने

लेवल बीउ

- अनिवार्य गरिएको र बीउ उत्पादन स्वयंले लगाउने

समग्रमा बीउ उत्पादन प्रक्रिया पुरा हुन दुईपक्षको गुणस्तर कायम भएको हुनुपर्दछ :



१. फिल्डमा बालीको गुणस्तर (Field Standards)

२. प्रयोगशालामा बीउको गुणस्तर (Seed Standards)

बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रणका विभिन्न चरणहरू:

१. विभिन्न विधाहरुमा बीउ विजन व्यवसाय सञ्चालन अनुमतीपत्र लिनुपर्ने:

विधाहरु निम्नानुसार रहेका छन्

- ❖ बीउ व्यापार गर्न (Seed Trading)
- ❖ बीउ आयात र निर्यात गर्न (Seed Import/Export)
- ❖ मूल/श्रोत बीउ उत्पादन गर्न (FS/Source seed Production)
- ❖ प्रयोगशाला संचालन गर्न (Seed testing Laboratory Operation in Private Sector)
- ❖ बाली निरक्षण, नमुना संकलन र बीउ विश्लेषण गर्न
(Crop Inspection, Seed Sampling and Seed Analysis)
- ❖ जातीय विकास र सम्बद्धन गर्न (variety development and maintenance)
- ❖ बर्णशंकर बीउ उत्पादन गर्न (Hybrid seed production)

माथी उल्लेखित विधाहरुमध्ये बीउ व्यापार गर्ने अनुमति नियमानुसार निश्चित प्रक्रिया पुगे सम्बन्धीत कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदान गर्दछ । बाकी सबै विधाहरुको अनुमतिपत्र नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पुगेको अनुगमन र निरिक्षण गरि बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले प्रदान गर्दछ । साथै अनुमति पाए पश्चात निश्चित अवधिपछि निश्चित समयभित्र नविकरण गर्नु अनिवार्य छ । साथै सबै बीउ कारोबार गर्ने एग्रोभेट एं बीउ उत्पादन गर्ने निकायले अनुमतिपत्र सबैले देखिने ठाउँमा राखुपर्दछ ।

२. भरपर्दो श्रोतबाट गुणस्तरीय बीउको प्रयोग

- राष्ट्रिय विजन समितिबाट सिफारीस तथा सुचिकृत भएको जातको बीउ हुनुपर्ने
- बीउ उत्पादन गर्दा प्रमाणिकरण गरिएको बीउ प्रयोग गरिनु पर्ने, द्याग सुरक्षित राख्नुपर्ने
- सम्पुर्ण तोकिएको गुणस्तर कायम भएको बीउ गनुपर्ने

३. बाली रोप्दा वा बीउ छर्दा पृथकता दुरी कायम गर्ने

- बीउ उत्पादन गरिने कुनै बालीको एउटा जातको खेत देखि सोही बालीको अर्को जातसम्मको वा जातीय शुद्धता नभएको उही जात लगाएको अर्को खेतसम्मको दुरीलाई पृथकता दुरी भनिन्छ ।
- सामान्यतया स्वयंसेजित बालीमा थोरै पृथकता दुरी भए पुछ भने परसेचित बालीलाई धेरै पृथकता दुरी आवश्यक पर्दछ ।
- परसेचित बाली लगाउँदा एउटा ब्लक वा खेतमा एउटा जात मात्र लगाउन सिफारिस गरिन्छ । यसो नगरे जातीय शुद्धता नहुने भएकोले बाली बीउ नहुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
- विभिन्न बालीहरुको न्यूनतम पृथकता दूरी तालिका नं. १ मा दिइएको छ ।

४. खेत निरिक्षण सम्बन्धी पूर्व जानकारी फाराम भरेर प्रयोगशालामा पठाउने

- खेतमा बीउ उत्पादनको लागी बीउ रोपे वा छारे पश्चात सम्पूर्ण विवरण खुलाई खेत निरिक्षण सम्बन्धी पूर्व जानकारी फाराम समयमै भरेर प्रयोगशालामा पठाउनुपर्दछ ।
- खेत निरिक्षण सम्बन्धी पूर्व जानकारी फाराममा भरेर पठाउनुपर्ने विवरणहरु र फाराम तल निम्नानुसार रहेको छ ।

खेत निरीक्षण सम्बन्धी पूर्व जानकारी फाराम

बीउ उत्पादकको नाम :

ठेगाना :

जिल्ला : न.पा./गा.पा.

वडा नं. :

गाँउ : सम्पर्क नं. :

बालीको नाम	जात	बीउको स्तर	बीउको श्रोत	श्रोत बीउको ट्याग नं. वा निस्साहरु	खेतको संस्था	कुल क्षेत्रफल	बीउ छरेको मिति	पाक्ने समय (अनुमानित)

द्रष्टव्य १) यदि बीउ उत्पादनको लागि बीउ छरेको खेत कृषकको घर नजिकै भएमा (क) खेतको पुरा ठेगाना (ख) त्यस क्षेत्र नजिकको बजार, गाँउको बाटो उल्लेख गर्ने ।

२) बीउ प्रमाणीकरणको ट्यागको नम्बरहरु प्रयोग गरेको बीउ बोसाको संस्था आदि उल्लेख गर्ने । बीउको श्रोत र स्तर उल्लेख गर्ने ।

बीउ उत्पादकको दस्तखत :

संस्थाको छाप:

मिति :

५. खडाबाली निरिक्षणमा बोलाउनु पूर्व अनिवार्य रूपमा रगिङ्ग कार्य गर्ने

- बीउ बालीमा आउने अनावश्यक अरु बोटहरु हटाई नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई रगिङ्ग कार्य भनिन्छ ।
- अनावश्यक बोटहरु भन्नाले सोही बालीका अरु जातका बोट, अरु बालीका बोट, भारपातका बोट र रोग किरा लागेका बोटहरुलाई बुझिन्छ ।
- रगिङ्ग कार्य जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिन्छ तर गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न अरु जातहरु मिसावट हुनबाट बचाउन बाली लगाएर फुल फुल्नुभन्दा अगाडीदेखि तै सुरुवात गनुपर्दछ, फुल फुलि सकेपछि र बाली काट्नुअघि रगिङ्ग कार्य गर्नुपर्दछ ।
- बीउ उत्पादक सहकारी वा कम्पनीहरुले व्यक्तिगत किसानलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा रगिङ्ग समिति बनाई रगिङ्ग टोलीलाई खटाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

६. खडाबाली खेत निरिक्षण

- खेत निरीक्षण कार्य खडा बालीमा गरिने हुनाले विशेष गरेर जातीय शृद्धता कायम राख्न मद्दत पुग्नुको साथै रोग किराको प्रकोप, भारपात तथा अन्य बालीको वारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
- विभिन्न बालीहरुको न्यूनतम खेत निरिक्षण पटक र समय तालिका २ मा रहेको छ ।

खेत निरिक्षणका मुख्य उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्

१. श्रोत बीउको स्तर पत्ता लगाउन,
२. अगाडिको बालीको स्थिति पहिचान गर्न,
३. जातीय पहिचान गर्न,
४. अन्यजात वा बेजातको स्थिति निक्यौल गर्न,
५. पृथकता दुरी निक्यौल गर्न,
६. अन्य बाली र भारपात पहिचान गर्न,
७. बीउवाट सर्ने रोग छ वा छैन भनि निक्यौल गर्न,
८. बालीको अवस्था हेर्न,
९. बालीले ढाकेको क्षेत्रफल जांच गर्न,
१०. अन्तमा बीउको लागि ठिक छ वा छैन भनि निष्पक्ष राय दिन ।

बाली अनुसार बीउ बाली निरिक्षण पटक र अवस्थाहरु

मुख्य अन्नबालीहरुमा (धान र गहुँ) सामान्यतया दुईपल्ट बाली निरिक्षण अनिवार्य हुन्छ

१. प्रथम बाली निरिक्षण : यो सामान्यतया पहिलो बाला निस्कने बेला वा निस्कीसकेपछि गरिन्छ । यसमा बालीको अवस्था हेरिन्छ र आवश्यक सुभावहरु दिइन्छ ।

२. अन्तिम बाली निरिक्षण: यो बाला पुरै निस्कीसकेपछि वा भौतिक परिपक्वता पछि गरिन्छ । यसमा नियमानुसार बाली निरिक्षकबाट आवश्यक संख्यामा आकँडा लिइन्छ र बीउ उत्पादनको लागी योग्य भए सिफारिस तथा अयोग्य भए निष्काशित गरिन्छ ।

विभिन्न बालीहरुको खडाबाली निरिक्षण गरीदैं



तालिका १: बालीको न्यूनतम स्तर (Minimum Field Standards)

क्र.सं.	बालीको नाम	न्यूनतम पृथकता दुरी (मि.)		अधिकतम वेजात बोटहरु (प्रतिशत)		ऋग्धिकतम रोगी बोटहरु (प्रतिशत)		निषेधित गरिएको रोगहरु
		मूल वीउ	प्रमाणित वीउ	मूल वीउ	प्रमाणित वीउ	मूल वीउ	प्रमाणित वीउ	
१	खाद्यान्न बाली							
१.१	धान	३	३	०.०५	०.२०	०.२	०.५०	नेक ब्लाष्ट
१.२	गहुँ	३	३	०.०५	०.३०	०.१०	०.५०	कालो पोके
१.३	मकै	३००	२००	१.०	२.०	-	-	-
१.४	जौँ	३	३	०.०५	०.३०	०.१०	०.५०	कालो पोके
१.५	कोदो	५	५	०.१	०.२	-	-	-
२	दाल बाली							
२.१	मास	१०	५	०.१०	०.२०	-	-	-
२.२	चना	१०	५	०.१०	०.२०	०.१०	०.५०	फ्युजेरियम विल्ट
२.३	बोडी	१०	५	०.१०	०.२०	०.१०	०.५०	एन्थ्राक्नोज
२.४	मसुरो	१०	५	०.१०	०.२०	-	-	फ्युजेरियम विल्ट
२.५	मुंग	१०	५	०.१०	०.२०	-	-	-
२.६	रहर	२००	१००	०.१०	०.२०	-	-	-
३	तेल बाली							
३.१	बदाम	३	३	०.१०	०.२०	-	-	-
३.२	तोरी, सर्यु	३००	२००	०.१०	०.२०	०.२०	०.५०	अल्टेनेरिया लिफ ब्लाष्ट
३.३	रायो	५०	२५	०.१०	०.५०	०.२०	०.२०	स्केलेरोटिनिया ब्लाइट
३.४	भटमास	३	३	०.१०	०.५०	०.१०	०.५०	एन्थ्राक्नोज

तालिका २: न्यूनतम खेत निरिक्षण पटक र समय:

क्र.सं.	बाली	निरिक्षण संख्या/पटक	निरीक्षणको अवस्था
१	धान, गहुँ र जौ	२	१. बाला निस्कने बेला वा बाला निस्कि सकेपछि २. बाली पाकिसकेपछि तर काटनुअघि वा भौतिक परिपक्वतापछि
२	मकै	२	१. धानचमरा आउनुअघि २. धानचमरा पुर्णरूपले निस्कीसकेपछि

३	तोरी र रायो	२	१. फूल फूल्ने बेला वा फूल्नुअघि २. कोसा लागेदेखि पाक्ने समयसम्म
४	करेला, लौका, धिरौला, कांक्रो र समर स्क्वास	३	१. फुल फुल्नु भन्दा अगावै २. फुल फुलिरहेको, फल लागिरहेको बेलामा ३. फल पूर्ण परिपक्व भईसकेपछि
४.	भेडे खूसानी र पिरे खूसानी	३	१. फुल फुल्नु भन्दा अगावै २. पूर्ण फुल फुलिरहेको बेलामा ३. फल परिपक्व भईसकेपछि
५.	गोलभेडा (टमाटर)	३	क. पहिलो फुल फुल्नु भन्दा अगावै ख. पूर्ण फुल फुलिरहेको बेलामा र फल लाग्नुभन्दा अगावै र ग. बाली पाकीसकेपछि

निषेधित गरिएको भारपात

धान बालीको लागि:-

- जंगली धान (Wild Rice) : *Oryza sativa L. Var. fatua prain*

गहुँ बालीको लागि:-

- मोर्निङ ग्लोरी /हिरण्यखुरी : *Convolvulus arvensis L.*
- रगते भार: *Phalaris minor*

७. बाली कटानी

- बीउ उत्पादन क्षेत्रमा Combine Harvester को प्रयोग सकेसम्म घटाउने या अनुभवी र धेरै क्षेत्रफल भएमात्र प्रयोग गर्ने ।
- बाली थ्रेसिङ गर्दा समेत एक जातदेखि अर्को जातमा जाँदा बीउ मिक्स हुने एवम् शुद्धतामा कमि आउने सम्भावना हुने हुँदा विशेष सतर्कता अपनाउने ।

८. चिस्यान एकिन गर्ने

- गोदाम घरमा अनिवार्य रूपमा चिस्यान नाप्ने यन्त्र (मोर्झिस्चर मिटर राख्ने) र बीउको न्यूनतम स्तर तालिका नं. ४ मा देखाए बमोजिम चिस्यानको अधिकतम प्रतिशत मा नभरुन्जेल सुकाउने ।

- याद राख्नुहोस अन्नबालीहरुको जति चिस्यानको मात्रा कम हुन्छ त्यती नै भण्डारण गर्ने क्षमता बृद्धि हुदै जान्छ ।

९. बीउको किलनिङ्ग तथा ग्रेडिङ्ग

- बीउको जातिय तथा भौतिक शुद्धता कायम गर्न बीउको सरसफाई तथा ग्रेडिङ्ग कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ ।
- चिस्यान एकीन गरिसकेपछि बीउलाई सामान्य सरसफाई गर्नुपर्दछ ।
- त्यसपछि ग्रेडिङ्ग मेशिनको प्रयोग गरि असामान्य बीउहरु हटाउनुपर्दछ । र शुद्धता कायम नभएसम्म आवश्यकता हेरी पुनः ग्रेडिङ्ग कार्य गर्नुपर्दछ ।
- ग्रेडिङ्ग कार्य दक्ष र अनुभवी व्यक्तिले गनुपर्दछ ।

१०. बीउ उपचार

- कुनै पनि बालीको प्रजनन तथा मूल स्तरको बीउलाई अनिवार्य रूपमा सिफारिश गरेको रोग निरोधक र कीटनाशक विषादीले उपचार गर्नु पर्दछ । अन्य स्तरको लागि आवश्यकतानुसार उपचार गर्नु पर्छ ।
- बीउ उपचारमेशिनको (सीड ट्रिटर)को सहायताले गरिन्छ ।
- मानिसको प्रयोग गरी बीउ उपचार गर्दा सबै सुरक्षात्मक पहिरन प्रयोग गरी बीउलाई राम्रोसँग मिसाई प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
- बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रणमा बीउ उपचार अनिवार्य हुन्छ ।
- बीउ उपचारले बीउ बाट सर्ने रोगहरु नियन्त्रण गर्नुको साथै बीउको उमारशक्ति पनि बृद्धि गर्दछ ।
- बिभिन्न बालीहरुको बीउ उपचार गर्ने विषादी फरक फरक हुन्छ । जस्तै गहुँबालीको लागी भाइटाभेक्स २ ग्राम प्रति के.जी. बीउका दरले प्रयोग गरिन्छ भने धानको लागी बेभिष्टन २ ग्राम प्रति के.जी. बीउका दरले बीउ उपचार गरिन्छ ।
- विषादीले उपचार गरेको बीउको भाँडोमा निम्न कुराहरु प्रष्ट देखिने गरी लेखिएको हुनु पर्दछ :

क. बीउ उपचारित छ

ख. उपचार गरिएको विषादीको नाम

ग. बीउ उपचार गरेको मिति

घ. यदि उपचारित विषादीले हानी गर्दछ भने बिषादी (Poison) भनी रातो र अलि ठूलो अक्षरले लेख्नु पर्दछ ।

११. बीउलाई बोरामा राख्ने

- बीउ उपचार गरिसकेपछि बीउलाई जुटको बोरामा वा प्लाष्टिकको बोरामा राख्नुपर्दछ ।
- बोराको अवस्था एकीन गरेर मात्रै बीउ राख्नुपर्दछ । प्वाल परेको, अन्य बालीको बीउ भएको, त्यही बालीको बीउ, बोराको चिस्यानको अवस्था हेरी मात्र बोरामा राख्नुपर्दछ ।

१२. बीउ भण्डारणको लागी बीउको लट बनाउने

- भौतिक रूप एवम् अरु गुण समान भएको बीउको परिमाणलाई एक लट बनाउनु पर्दछ । हरेक लटलाई संकेतबाट छुट्याउन लट नम्वर राख्नुपर्दछ ।
- लट बनाउँदा निम्न कुराहरुमा ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछः
 - एकै जलवायू र एकै समयमा उत्पादन गरेको ।
 - बाली, जात र स्तर समान भएको ।
 - समान भौतिक गुण र चिस्यानको मात्रा समान भएको ।
 - बीउको उमारशक्ति ५ प्रतिशत भन्दा फरक नभएको ।

बीउको लटको परिमाण

क.मकैको अधिकतम ४० टन

ख.धान, गहुँ तथा सोही आकारमा धेरै उत्पादन हुने ठूलो खालका बीउको हकमा ३० टन अधिकतम

ग.धान, गहुँ भन्दा सानो आकारको बीउ हुने बालीको हकमा १० टन अधिकतम

घ.विभिन्न बालीको लटको अधिकतम परिमाण तलको तालिका नं. ३ अनुसार हुनेछ

तालिका ३ : बीउको लटको परिमाण र परीक्षणार्थ पठाइने नमूनाको न्यूनतम परिमाण

क्र.सं.	बाली	लटको परिमाण (के.जी.)	परीक्षणार्थ पठाइने नमूनाको न्यूनतम परिमाण (ग्राम)	शुद्धता परीक्षणको लागि चाहिने कार्य नमूनाको न्यूनतम परिमाण (ग्राम)	अन्य बीउको पहिचान परीक्षणको लागि चाहिने कार्य नमूनाको न्यूनतम परिमाण
खाद्यान्न बाली					
1	गहुँ	30000	1000	120	1000
2	धान	30000	700	70	700
3	मकै	40000	1000	900	1000
4	जौ	30000	1000	120	1000
5	जै	30000	1000	120	1000
6	कोदो	10000	60	6	60
दालबाली					
1	बोडी	20000	1000	250	1000
2	च्छा	20000	1000	1000	1000
3	मुङ्ड	20000	1000	120	1000
4	मास	20000	1000	700	1000
5	मुखुरो	10000	600	60	600
6	रहर	20000	1000	300	1000
7	भटमास	25000	1000	500	1000
8	केराउ	25000	1000	900	1000
तेलबाली					
1	कपास	25000	1000	350	1000
2	द्वाम	25000	1000	1000	1000
3	तोरी	1000	100	10	100
4	सरस्यू	1000	100	10	100
5	आलस	1000	150	15	150
6	तील	1000	70	7	70

क्र.सं.	बाली	लटको परिमाण (के.जी.)	परीक्षणार्थ पठाइने नमूनाको न्यूनतम परिमाण (ग्राम)	शुद्धता परीक्षणको लागि चाहिने न्यूनतम परिमाण (ग्राम)	जातीय परीक्षणको लागि चाहिने न्यूनतम परिमाण (ग्राम)
तरकारी बाली					
1	मेरी	10000	400	40	40
2	पालुङ्गी	10000	250	25	250
3	तितेकरोला	10000	450	70	450

4	धिरौला	20000	1000	500	1000
5	कॉर्को	10000	150	70	150
6	खरबुजा	10000	150	70	150
7	फर्सी	20000	1000	700	1000
8	पाटेधिरौला	20000	1000	500	1000
9	ब्रोकाउली	10000	100	10	100
10	बन्दा	10000	100	10	100
11	ग्याँठकोवी	10000	100	10	100
12	मूला	10000	300	30	300
13	सलगम	10000	70	7	70
14	गाँजर	10000	30	3	30
15	रामतोरिया	20000	100	140	100
16	भण्टा	10000	150	15	150
17	चम्सुर	10000	6	6	6
18	प्याज	10000	80	8	80
19	सिमी	25000	1000	1000	1000
20	गोलभेडा	10000	15	7	15
21	भेडेखुर्सानी	10000	150	15	150
22	पिरोखुर्सानी	10000	150	15	150
23	काउली	10000	100	10	100
24	स्वीसचार्ड	20000	500	50	500
25	तरबुजा	20000	1000	250	1000

लटको संकेत संख्या राख्ने विधि

लट नम्बरमा चार भाग हुन्छन्

पहिलो भाग

यस भागले महिना र वर्षको सांकेतिक शब्द र अंकलाई जनाउँछ । यो भागले कुन समयमा बाली काटिएको हो भन्ने जनाउँछ । महिनाको सानो रूप असार बाहेक अरु महिनाको शूरुको एक अक्षर हुन्छ भने असारको “असा” भनी जनाइन्छ । महिनाको सानो रूप निम्न अनुसार हूनेछ ।

महिना	सानो रूप	महिना	सानो रूप
बैशाख	बै	कार्तिक	क
जेष्ठ	जे	मंसिर	मं
असार	असा	पुष	पु
श्रावण	श्रा	माघ	म
भाद्र	भ	फाल्गुण	जा
असोज	ऋ	चैत्र	चै

वर्षको अन्तिम दूई अंकले वर्ष भनी जनाउनेछ । जस्तै ७६ भन्नाले २०७६ साल मान्नु पर्छ ।

दोश्रो भाग

महिना र वर्षपछिको अक्षरले उत्पादन भएको जिल्लालाई जनाउँछ । जिल्लाको संकेत निम्न बमोजिम हुनेछ ।

जिल्ला	सानो रूप	जिल्ला	सानो रूप
कैलाली	कै	अछाम	अछा
कंचनपुर	कं	दार्चुला	दार्चु
डडेल्धुरा	ड	बैतडी	बै
डोटी	डोटी	बझाङ्ग	झा
बाजुरा	बाजु		

तेश्रो भाग

तेश्रो भागको अंकले बीउ प्रशोधन कारखानालाई जनाउँछ । कारखानाको संकेत निम्न अनुसार छ ।

प्रशोधन कारखाना	संकेत नं.
कृषि विकास फार्म, सुन्दरपुर	३७
पञ्चशक्ति बीउ कं. प्रा.लि., धनगढी	३९
युनिक सीड कम्पनी, धनगढी	२७
अपी हिमाल एगो एण्ड लाइभस्टक कम्पनी प्रा.ली.	३८
बीज बृद्धि कृषक स.सं.ली, जानकी गा.पा. ४, मुनुवा, कैलाली	४७

चौथो भाग

- चौथो भागको अड्डले बीउ उत्पादक जनाउँछ । यदि उही कृषकले एक लटमा राख्न सकिने भन्दा बढी परिमाणमा बीउ उत्पादन गरेको भएमा उही संकेत नम्बर राख्ने तर संख्याको छेउमा रोमन अंक कोष्ठभित्र पहिलो लटको लागि (I), दोश्रोको लागि (II) तेश्रोको लागि (III) गरी लेख्दै जाने ।
- यदि कुनै लटको बोरामा बै७६-कं-३१-०२ लेखिएको छ भने त्यसले निम्न जानकारी प्रदान गर्दै
- बै— बैशाख महिना
- ७६— २०७६ साल
- कै— कैलाली जिल्लामा उत्पादन भएको
- ३१— बीउ प्रशोधन कारखाना पञ्चशक्ति बीउ कम्पनी प्रा.लि., धनगढीमा व्यागिङ्ग (बोराबन्दी) भएको
- ०२— बीउ उत्पादकको संकेत नम्बर

नोट: बीउ प्रशोधन, प्रशोधन कारखानामा नभै अन्य तरिकाबाट भएको भए सो बापतको संकेत दिन नपर्ने ।

बीउ नमूनाका प्रकार

क) प्राथमिक नमूना (Primary Sample)

हरेक लटको बीउ संचय गरी राखिएको विभिन्न भाँडो (जस्तै: घ्याम्पो, भकारी, बोरा, खलियान, धन्सार) को विभिन्न ठाउँ र गहिराईबाट लिइएको छुट्टाछुट्टै नमूनालाई प्राथमिक नमूना भनिन्छ ।

ख) समिश्रित नमूना (Composite Sample)

एकैनासको प्राथमिक नमूनाहरु एक ठाउँमा मिसाइ समिश्रित नमूना तयार गरिन्छ ।

ग) परीक्षणार्थ पठाईने नमूना (Submitted Sample)

समिश्रित नमूनाबाट विधिपूर्वक अनाबश्यक परिमाण भिकी परीक्षणको लागि आबश्यक परिमाण मात्र राखिएको नमूनालाई परीक्षणार्थ पठाईने नमूना भनिन्छ ।

घ) परीक्षण गर्ने नमूना (Working Sample)

परीक्षणार्थ प्राप्त नमूनाबाट परीक्षण तथा विश्लेषण गरी गुणस्तर पत्ता लगाउन विधिपूर्वक भिकिएको नमूनालाई बीउ परीक्षण गर्ने नमूना भनिन्छ ।

बीउको लटबाट नमूना भिक्ने कार्य गरिदै



बीउको नमूना लिने साधनहरु

क) प्रोव वा स्लिभ ट्रायर :

- यी औजारहरु खण्डित हुन्छन् र मोटो, मसिनो, लामो, छोटो विभिन्न आकार प्रकारमा पाइन्छन् ।
- नमूना लिंदा यी ट्रायरलाई प्वाल बन्द गरी तेसों पारेर घुसानु पर्दछ ।
- ट्रायर भित्र घुसाइ सकेपछि एक दुई पटक प्वालहरु खोल्ने बन्द गर्ने गर्नु पर्दछ ताकि बीउ भित्र पस्न सक्नु ।
- अन्तमा बीउ नोक्सान नहुने गरी प्वाल बन्द गरेर ट्रायर भिक्नु पर्दछ ।

ख) नोब ट्रायर वा स्पियर:

- भित्र खाली एउटा खोको ट्यूव हुने यो औजार पनि विभिन्न मोटाई र लम्बाईमा पाइन्छ ।
- चुच्चोको प्वाललाई ४० डिग्रीको कोणमा तलतिर पारी बोरामा घुसार्ने र भित्र पुगी सकेपछि स्पियरलाई घुमाएर प्वाल भएको भागलाई माथितिर फर्काई बीउ निकाल्नु पर्दछ ।

ग) हातः

- माथिको औजारहरु उपलब्ध नभएमा वा औजारबाट नमूना लिन कठीन हुने अवस्थामा हातले नमूना लिन सकिन्छ ।
- यसमा हातको औंला टम्म पारी बोरा वा भाँडाभित्र घुसार्ने र मुट्ठी कसेर नमूना लिने र मुट्ठी कस्सीएकै अवस्थामा हात बाहिर निकाल्नु पर्दछ ।

ट्रायरको तस्वीर

१. स्लिभ ट्रायर



२. नोव ट्रायर



नमूना संकलन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु

- (१) प्रोव ट्रायर
- (२) नमूना लिने प्लाष्टिक वा कपडाको भोलाहरु
- (३) सम्मिश्रित नमूना बनाउन चाहिने भाँडाहरु
- (४) रबर व्याण्ड
- (५) नमूना विवरण फाराम
- (६) मार्कर पेन
- (७) सिलबन्दी गर्न आवश्यक सामानहरु

न्यूनतम प्राथमिक नमूना संख्या

क. थुप्पाइएको बीउको लटबाट

प्रत्येक लटमा बीउको परिमाण	न्यूनतम प्राथमिक नमूना संख्या
५०० के.जी .सम्म	५ वटा
५०१ देखि ३,००० के.जी.सम्म	प्रत्येक ३०० के.जी.मा १ तर कम्तिमा ५ वटा
३,००१ देखि २०,००० के.जी.सम्म	प्रत्येक ५०० के.जी.मा १ तर कम्तिमा १० वटा
२०,००१ के.जी. देखि माथि	प्रत्येक ७०० के.जी.मा १ तर कम्तिमा ४० वटा

ख. बोरा वा भाँडोमा राखेको बीउको लटबाट

प्रत्येक लटमा बीउको परिमाण	न्यूनतम प्राथमिक नमूना संख्या
१-४ भाँडा भएमा	प्रत्येक भाँडाबाट ३ वटा नमूना
५-८ भाँडा भएमा	प्रत्येक भाँडाबाट २ वटा नमूना
९-१५ भाँडा भएमा	प्रत्येक भाँडाबाट १ वटा नमूना
१६-३० भाँडा भएमा	कुल १५ नमूना
१६-३० भाँडा भएमा	कुल २० नमूना
६० वा सो भन्दा बढि भाँडा भएमा	कुल ३० नमूना

ग. सानो कागजको खाम वा अरु किसिमको सानो पाकेट

साना पाकेटहरुको तौल जोडेर प्रत्येक १०० के.जी.को एक इकाई बनाउने । एक इकाईलाई एउटा भाँडो मानेर आवश्यक संख्यामा सिंगो पाकेट नै नमूना लिने ।

नमूना लिंदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

- १) बीउको नमूना त्यस सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्र लिनु पर्दछ ।
- २) व्यवस्थित तरिकाले राखिएको बोराबाट बीउको नमूना लिनु पर्दछ । यदि बोरा व्यवस्थित हिसावले राखिएको छैन भने व्यवस्थित हिसावले बोरा राख्न लगाएर मात्र नमूना लिनु पर्दछ ।
- ३) संकेत नम्बर राखिएको लटबाट मात्र नमूना संकलन गर्नु पर्दछ ।
- ४) नमूना संकलकले बीउ राखिएको स्थलमा नै नमूनाको चिस्यान परिक्षण गर्नु पर्दछ । चिस्यान बढी भएमा तुरुन्त सुकाउन सुझाव दिनु पर्दछ । यदि नमूना संकलन गर्ने स्थानमा चिस्यान परिक्षण गर्न नमिल्ने भएमा तुरुन्त बाक्लो प्लाष्टिकको झोलामा हावा नछिन्ने गरी नजिकको प्रयोगशालामा पठाउनु पर्दछ । चिस्यान परिक्षणको लागि पिस्नु पर्ने ठूलो दाना जस्तै धान, गहुँ, मकै, दलहन बाली भए कम्तीमा १०० ग्राम र पिस्नु नपर्ने सानो दाना भए ५० ग्राम नमूना अलगौ पठाउनु पर्दछ ।
- ५) बोरामा ट्रायर घुसार्दा पर्ने प्वाललाई ट्रायरको चुच्चोले बोराको धागो तलमाथि सारी वा कडा टेपले टाँसी बन्द गरी दिनु पर्दछ ।
- ६) शंकास्पद बोराबाट छुट्टै नमूना लिई बोरामा चिनो लगाउनु पर्दछ ।

बीउको लटबाट प्राथमिक नमूना लिने तरिका

१. बीउ सञ्चय गरेको कुनै पनि भाँडा वा बोराबाट प्राथमिक नमूना लिंदा प्रत्येक ठाउँबाट उत्तिकै परिमाणमा बीउ भिक्नु पर्दछ ।

२. खलियान, धन्सार, भकारी आदि एकै ठाउँमा थुपारेको अवस्थामा विभिन्न ठाउँ तथा गहिराईबाट वा हात प्रयोग गरी प्राथमिक नमूना भिक्नु पर्दछ ।

३. बोरा वा अन्य भाँडोमा सञ्चय गरेको अवस्थामा बोरा वा भाँडा नछानिकन विना भेदभावले कुनै माथिल्लो बोराबाट कुनै विचको बोराबाट र कुनै तल्लो वा पिंधको बोराबाट ट्रायरको प्रयोग गरी प्राथमिक नमूना भिक्नु पर्दछ ।

४. नमूना लिने क्रममा बीउ भिकी सकेपछि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्दछ । यदि, ट्रायरबाट बाहिर निकालिएको प्राथमिक नमूनाको रङ्ग वा अन्य कुराहरु फरक देखिएमा ती नमूनाहरूलाई छुट्टै पोको पारी परीक्षणको लागि बीउ परीक्षण प्रयोगशालामा पठाउनु पर्दछ । यदि परीक्षणबाट गुणस्तरमा फरक नतिजा प्राप्त भएमा ती बोराहरु वा भाँडाहरु उक्त लटबाट हटाउनु पर्दछ ।

समिश्रित र परिक्षणार्थ पठाइने नमूना तयार गर्ने तरिका

- एउटै लटबाट भिकेको एकनासको देखिने विभिन्न प्राथमिक नमूनालाई एक ठाउँमा मिसाएर समिश्रित नमूना बनाउने ।
- मिसाउने कार्य हातले चलाएर वा यन्त्रको सहायताबाट गर्न सकिन्छ ।
- राम्ररी मिसाइएको नमूनालाई मेकानिकल डिभाईडरको प्रयोगबाट आधा आधा गर्दै एक भाग हटाउने, अर्को भाग लिने गरेर परिक्षणार्थ पठाउन आवश्यक पर्ने परिमाणमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
- मेकानिकल डिभाईडर वा अन्य यन्त्रको अभावमा सम्मिश्रित नमूनालाई हातले बराबर दुई भाग लगाउने, हरेकलाई फेरी दुई भाग लगाउने । यसरी जम्मा सोहँ भाग तयार भएपछि प्रत्येक एक भाग बिराएर आठ भाग लिने । यदि बीउको परिमाण आवश्यकता भन्दा धेरै छ भने आफूलाई चाहिने परिमाण तयार नहुँदासम्म यो प्रकृयालाईलाई निरन्तरता दिई ठिक्क परिमाणमा परिक्षणार्थ पठाइने नमूना तयार गर्नु पर्दछ ।

परिक्षणार्थ नमूना पठाउने

१. चिस्यान बाहेक अन्य गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइने नमूनालाई बाक्लो कपडाको झोलाभित्र राखी मुख राम्रोसँग सिलाई दिनुपर्दछ ।

२. यसरी तयार पारेको पोकामा सिलाई गरेको मुख्य दुई ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार धागो छोप्ने गरी लाहाछाप लगाई सिलबन्दी गर्नु पर्दछ । लाहाछापको चिन्ह प्रष्ट देखिने गरी लगाउनु पर्दछ ।

३. यसरी तयार गरेको पोकाको एकापट्टी प्राप्त गर्ने कार्यालयको पुरा नाम, ठेगाना र अर्कोपट्टी पठाउने कार्यालयको नाम, ठेगाना लेखी बीउ नमूना परीक्षणको लागि हुलाकद्वारा वा कुनै व्यक्ति मार्फत प्रयोगशालामा पठाउने ।

१३. खडाबाली निरिक्षण पश्चात बीउको लट तयार भई सके पछि लटबाट बीउ परिक्षणको लागी नमूना विवरण फाराम भरी बीउको नमूना प्रयोगशालामा पठाउनु पर्दछ ।
बीउको नमूना विवरण फाराम

अनुरोध नं. : परीक्षण नं. :

नमूना पठाएको मिति : नमूना प्राप्त मिति :

नमूना पठाउनेको नाम र ठेगाना : कैफियत :

(नमूना पठाउनेले भर्ने)

प्रकार /जात :

बीउको स्तर (✓) लगाउने

(क) प्रजनन् वीउ (ख) मूल वीउ (ग) प्रमाणित वीउ (घ) उन्नत वीउ (ड) अन्य (कुनै भए जनाउने)

:

(च) परीक्षणको किसिम (✓) लगाउने

(क) सम्पूर्ण परीक्षण (ख) उमारशक्ति (ग) शुद्धता (घ) चिस्यान

(ड) स्वस्थ्य (च) १००० दानाको तौल (छ) अन्य (कुनै भए जनाउने) :

यदि परीक्षण जरुरी भए परीक्षणको किसिम (कारण) :

वीउ पठाउनेको नाम : दस्तखत : मिति :

ठेगाना :

वीउको लट नं. वा संकेत :

वीउको लटको परिमाण : (के.जी.)

लटमा बोरा वा अन्य भाँडाको संख्या :

प्राथमिक नमूनाहरूको संख्या : उत्पादन वर्ष :

वीउ उपचारित भए (उल्लेख गर्ने) विषादीको नाम : मात्रा :

नमूना लिनेको नाम र पद : हस्ताक्षर :

कैफियत (यदि केहि भए उल्लेख गर्ने) :

१४. प्रयोगशालामा परिक्षण कार्य

प्रयोगशालामा बीउ परीक्षण कार्य गरिदै



१५. बीउको प्रमाणीकरण पूर्व लटबाट नमुना निकाली प्रयोगशालाका प्राविधिकद्वारा आफै नमुना निकाली कसचेक कार्य गरिन्छ ।

१६. प्रयोगशालामा बीउ परिक्षण गरिसकेपछि आउनुपर्ने बीउको न्यूनतम स्तर निम्नानुसार तालिका ४ बमोजिम रहेको छ ।

तालिका ४: बीउका लागी आवश्यक न्यूनतम स्तर (Minimum Seed Standards)
प्रमाणीकरण (मल र प्रमाणित) तथा उन्नत बीउको लागी

१	तने वोडी	९८	२	०	०	०	०	५	५	७५	१०	७	९७	७०
२	करेला	९८	२	०	०	०	०	५	५	६५	९	६	९७	६५
३	रायो साग	९८	२	५	१०	५	१०	-	-	७५	९	५	९७	७५
४	झांगे सिमी र घिउ सिमी	९८	२	०	०	०	०	-	-	७५	१०	७	९७	७०
५	बन्दा	९८	२	०	०	०	०	-	-	७५	८	५	९७	७०
६	मेडे खुसानी	९८	२	५	५	५	५	-	-	६५	९	६	९७	६५
७	गाजर	९६	४	५	५	५	५	५	५	६५	९	६	९४	६५
८	काउली	९८	२	०	०	०	०	-	-	७५	८	५	९८	७०
९	खुसानी (पिरो)	९८	२	५	५	५	५	-	-	६५	९	६	९७	६५
१०	कांको	९८	२	०	०	०	०	-	-	६५	९	६	९७	६५
११	भेण्टा	९८	२	०	०	०	०	-	-	७०	९	६	९७	६५
१२	रामतोरिया	९९	१	०	०	०	०	५	५	७०	१०	७	९८	७०
१३	व्याज	९८	२	५	१०	५	१०	-	-	७०	९	६	९७	६५
१४	केराउ	९८	२	०	०	०	०	५	१०	७५	१०	७	९७	७०
१५	मुला	९८	२	५	१०	५	१०	-	-	७५	८	५	९७	७०
१६	घिरौला	९८	२	०	०	०	०	५	५	६५	९	६	९७	६५
१७	फर्सी (जुकिनी)	९८	२	०	०	०	०	-	-	६५	९	६	९७	६५
१८	गोलभेडा	९८	२	५	१०	०	०	-	-	७०	९	६	९७	७०
१९	सलगम	९८	२	५	१०	५	१०	-	-	७५	९	५	९७	७०

नोट: * = जम्मा भारपत्रको बीउ

१७. बीउ प्रमाणीकरणको लागी आवश्यक सबै प्रक्रिया पुगेको भए प्रमाणीकरणको लागी आवेदन फाराम दिने :

- बीउ उत्पादन गरी खडा बालीनिरक्षण भइ सकेपछि सिफारिस भएको बीउ भण्डारण गरि सके पछि बीउ नमुना संकलन गरि प्रयोगशालामा परिक्षण पश्चात बीउको तोकिएको न्यूनतम स्तर भित्र आएमा बीउ प्रमाणीकरणको लागी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय बीउ विजन प्रयोगशालामा निवेदन दिनुपर्दछ ।
- निवेदनको साथमा निम्न विवरण भरेर पठाउनुपर्नेछ :

क्र.सं.	कार्यालय वा संस्थाको नाम	बाली	जात	स्तर	लट नं.	परिमाण मे.ट.	बीउको गुणस्तर		
							उमारशक्ति	शुद्धता	चिस्यान
			जम्मा						

१८. बीउ प्रभाणीकरणको लागी प्रयोगशालाको कर्मचारी बोलाउनुपूर्व द्याग, खडाबाली रिपोर्ट, ल्याव रिपोर्ट, बीउ उपचार, आदी दुरुस्त राख्नुपर्दछ ।

बीउ प्रमाणिकरणको लागी ग्रेडिङ, बीउ उपचार र बोरा सिलाएर दृयाग राखीदै



१९. बीउ प्रमाणीकरण कार्य

- बीउ प्रमाणीकरण भनेको कुनै सिफारिस जातको बीउ उत्पादन तथा त्यस उप्रान्तका कृयाकलापमा आवश्यक रोहवरी र निगरानी राख्दै बीउको गुणस्तरीयताको र्यारेण्टी गर्नको लागि अपनाइने कार्य प्रणाली हो ।
- यसमा बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण निकाय वा प्रयोगशालाले श्रोत बीउ, बीउ वाली, खलिहान, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण आदिको निरीक्षण गरी तयारी बीउको नमुना जाँच गर्दछ र गुणस्तरको हदभित्र रहेको वित लटका हरेक वोरामा निसाना सहितको संकेतपत्र राखी सिलबन्दी गर्दछ ।

- बीउ विजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन, २०६४) ले बीउ प्रमाणीकरणलाई स्वेच्छामा छाडेको छ भने यथार्थ संकेतपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०. नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको बीउ विजन सम्बन्धि सेवा शुल्क निम्न बमोजिम रहेको छ ।

बीउ विजन सम्बन्धि सेवा शुल्क दर

खण्ड ६३ अतिरिक्ताँ ३०क नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति : २०७०/११/०१

क्र.सं.	परीक्षणको किसिम	यथार्थ खर्च रकम रु.
१.	उमारशक्तिको परीक्षण	२२८/-
२.	शुद्धता परीक्षण	१०४/-
३.	चिस्यान परिक्षण	१५४/-
४.	टेट्राजोलियम परीक्षण	२८८/-
५.	ओजस परीक्षण (Vigour Test)	२३२/-
६.	बीउको स्वास्थ्य परीक्षण	३५१/-
७.	१००० दानाको तौल	११० /-
८	बीउ नमुना लिए वाफत शुल्क	२१४/- प्रति नमुना
९.	खेत निरीक्षण	३२०/- प्रति हेक्टर
१०	बीउ प्रमाणिकरण	१००/-प्रति मेट्रन.

खण्ड : २

नेपालमा हालसम्म उन्मोचित तथा दर्ता (पञ्जिकृत) विभिन्न बालीका जातहरु

१. अन्नबाली

क) धान

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मि. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	सावित्री	२०२२ (१९७९)	१४०	४.०	तराई र भित्रीमध्येश
२	खुमल ३	२०४१ (१९८३)	१३०	६.५	मध्य पहाड
३	खुमल २	२०४४ (१९८७)	१४२	५.६	काठमाडौं उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फीटदेखि ४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड
४	खुमल ४	२०४४ (१९८७)	१४४	६.३	काठमाडौं उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फीटदेखि ४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड
५	मकवानपुर १	२०४४ (१९८७)	१५०	४.३	दुइगे कीराको प्रकोप भएको तराई
६	घैया २	२०४४ (१९८७)	११३	३.४	तराईको असिंचित पाखा
७	खुमल ५	२०४७ (१९९०)	१५४	६.७	१००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाइ भएका पश्चिमी मध्यपहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी
८	खुमल ७	२०४७ (१९९०)	१४६	७.०	१००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाइ भएका पश्चिमी मध्यपहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी
९	खुमल ९	२०४७ (१९९०)	१४८	६.७	१००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाइ भएका पश्चिमी मध्यपहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी
१०	राधा ७	२०४८ (१९९२)	१४८	३.५	तराई, भित्रीमध्येश र सोसरह हावापानी भएको अकाशो खेती गरिने क्षेत्र
११	राधाकृष्ण ९	२०४८ (१९९२)	१५०	३.८	तराई, भित्रीमध्येश र सो सरह हावापानी भएको सिञ्चित भूमि
१२	राधा ४	२०५२ (१९९५)	१२५	३.२	मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम तराई (कपिलवस्तु, दाङ, वर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर)
१३	राधा ११	२०५२ (१९९५)	१४८	४.०	मध्यतराई (पर्सा, वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा)
१४	राधा १२	२०५२ (१९९५)	१५५	४.६	पूर्वी तराई

१५	खुमल ६	२०५६ (१९९९)	१५५	७.८	काठमाडौं उपत्यका एवं सो सरहको हावापानी हुने ठाउँ
१६	रामपुर मसुली	२०५६ (१९९९)	१३५	५.७	तराई, भित्रीमधेश, बेंशी एवं मध्यपहाडको १०० मिटर उचाईसम्म अथवा मसुली धान लगाउन सकिने सबै क्षेत्र
१७	चन्दननाथ १	२०५८ (२००२)	१९१	५.०५	जुम्ला वा सो सरहको हावापानी भएको क्षेत्र
१८	चन्दननाथ ३	२०५८ (२००२)	१९२	५.३	जुम्ला वा सो सरहको हावापानी भएको क्षेत्र
१९	खुमल ११	२०५८ (२००२)	१४४	८.५	काठमाडौं उपत्यका
२०	हर्दिनाथ १	२०६० (२००४)	१२०	४.०३	तराई, भित्रीमधेश, रिभर बेसिन ८०० मिटरसम्म
२१	लोकतन्त्र	२०६३ (२००६)	१२५-१३०	३.६	तराई, भित्रीमधेश, तल्लो पहाड र मध्यपहाडका नदी किनारा
२२	मिथिला	२०६३ (२००६)	१४५-१५०	३.५-४.५	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडको बेसी
२३	राम	२०६३ (२००६)	१३०-१३७	४.०-७.२	तराई, भित्रीमधेश -शिवालिक उपत्यका, मकवानपुर, चितवन र नवलपरासी)
२४	वर्षे ३००४	२०६३ (२००६)	१५७	३.८	तराई र भित्रीमधेश
२५	पोखेली जेठोबुढो	२०६३ (२००६)	१८०-१८५	२.६	पोखरा उपत्यका र यस आसपासका क्षेत्रहरू (६०० देखि १०० मिटर उचाई)
२६	खुमल ८	२०६३ (२००७)	१५८	७.७	मध्य पहाड र तल्लो पहाड
२७	सुनौलो सुगन्धा	२०६४ (२००८)	१५१	३.८	तराई, भित्रीमधेश
२८	घैया १	२०६६ (२०१०)	११५	२.५-३.५	असिचित Upland तराई, टार तथा मध्यपहाडका उपत्यका
२९	लल्का वास्मति	२०६६ (२०१०)	१५०	२.५-३.५	मध्य तथा पूर्वी तराई
३०	हर्दिनाथ २	२०६६ (२०१०)	१२५	३.१-४.२	तराई तथा भित्रीमधेश
३१	तरहरा १	२०६६ (२०१०)	११३-१२५	४.२	मध्य तथा पूर्वी तराई
३२	डि. वाई. १८ (पञ्जीकरण मात्र)F1	२०६६ (२०१०)	११८	९.१७	तराई तथा भित्रीमधेश
३३	डि. वाई. २८ (पञ्जीकरण मात्र)F1	२०६६ (२०१०)	१२०	८.८६	तराई तथा भित्रीमधेश
३४	डि. वाई. ६९ (पञ्जीकरण मात्र)F1	२०६६ (२०१०)	१२५	९.५२	तराई तथा भित्रीमधेश
३५	खुमल-१०	२०६८ (२०११)	१३६ (१०७-१७०)	४.७८	काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र।
३६	खुमल-१३	२०६८ (२०११)	१४४ (११७-१८३)	४.१७	काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र।

३७	सुख्खा धान - १	२०६८(२०११)	१२३-१२५	३.२-४.२	पुर्व तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मिटरसम्मका बेसी तथा टार।
३८	सुख्खा धान - २	२०६८(२०११)	१२२-१२४	२.३-३.५	पुर्व तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेसी तथा टार
३९	सुख्खा धान - ३	२०६८(२०११)	१२२-१२५	२.५-३.६	पुर्व तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेसी तथा टार
४०	बर्षे - २०१४	२०६८(२०११)	१३५-१४०	३.८	तराई
४१	स्वर्णा सब -१	२०६८(२०११)	१५०-१५५	४-५	तराई, तथा भित्री मधेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेसीको सिंचित तथा घोल क्षेत्र।
४२	बर्षे - १०२७ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	१२१	३.३	असिंचित तराई र मध्य पहाडका १००० मिटरसम्मका बेसी तथा टार अर्धसिंचित तथा असिंचित क्षेत्र।
४३	साँवा मसुली सब -१	२०६८(२०११)	१४५-१५०	३.५-४	तराई, तथा भित्री मधेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका बेसीको सिंचित तथा घोल क्षेत्र।
४४	एराईज - ६४४४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२२	४.४३	तराई र भित्री मधेसको सिंचित क्षेत्र
४५	पि. एच. बी. -७१ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२९	५.२६	तराई/सिंचित
४६	यु. एस. - ३१२ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१३२	५.४६	सलाही देखि बांके सम्मको तराई र भित्री मधेश
४७	च्याम्पीयन , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१३६	५.१५	सलाही देखि बांके सम्मको तराई र भित्री मधेश
४८	राजा , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२६	४.९४	सलाही देखि बांके सम्मको तराई र भित्री मधेश
४९	आर.एच. -२५७ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२३	४.९९	तराई र भित्री मधेस
५०	गोरखनाथ -५०९ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२३	४.८२	तराई र भित्री मधेस
५१	लोकनाथ - ५०५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१२९	४.७९	तराई र भित्री मधेसको सिंचित क्षेत्र

५२	पि. ए. सि. - ८०१ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	९२३	७.७९	तराई र भित्री मधेसको सिंचित क्षेत्र
५३	रेशमा - ७८६, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	९२०	४.९१	पुर्वी तराईको सिंचित क्षेत्र
५४	लेकाली धान - १	२०७१(२०१४)	१५८	४.०७	१५००- २६०० मिटर सम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र ।
५५	लेकाली धान - ३	२०७१(२०१४)	१५२	३.९	१५००- २६०० मिटर सम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र ।
५६	सुखबा धान - ४	२०७१(२०१४)	११८-१२५	२.७ -४	तराई र भित्री मधेसको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर उचाईको टार
५७	सुखबा धान - ५	२०७१(२०१४)	१२५	३.२ □ ४.२	तराई र भित्री मधेसको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर उचाईको टार बसी ।
५८	सुखबा धान - ६	२०७१(२०१४)	१२०-१२५	३ □ ४	तराई र भित्री मधेसको असिंचित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर उचाईको टार बेसी ।
५९	सिन्धुरी -पञ्जीकरण मात्र) ओ.पि.	२०७२(२०१५)	१३५-१४५	४-५	तराई र भित्री मधेस
६०	सुन्दरम -पञ्जीकरण मात्र) ओ.पि.	२०७२ (२०१५)	१२०-१२५	४.४-५.३	तराई र भित्री मधेस
६१	डेल्टा रानी -पञ्जीकरण मात्र) ओ.पि.	२०७२ (२०१५)	१२४-१२८	३.९-५	तराई र भित्री मधेस
६२	आकाश -पञ्जीकरण मात्र) ओ.पि.	२०७२ (२०१५)	१२०-१२५	६-६.३	तराई र भित्री मधेस
६३	गरिमा F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	१३०-१३५	५.८-६.३	तराई र भित्री मधेस
६४	डि आर एच ७७५ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	१२५-१३०	५.६	तराई र भित्री मधेस
६५	डि आर एच ७४८ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	१३०-१३५	६.५	तराई र भित्री मधेशको सिंचित क्षेत्र
६६	एराइज ६४४४ गोल्ड F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	१३०	५.१	बाँकेदेखि पूर्वको तराई र भित्री मधेश
६७	एराइज तेज गोल्ड	२०७२ (२०१५)	१३५	५.३	बाँकेदेखि पूर्वको तराई र भित्री मधेश

	F1(पञ्जीकरण मात्र)				
६८	जि के ५०१७F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२७	५.१-५.४	तराई र भित्री मधेश
६९	सुपर १२५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२८-१३३	५.३-६.३	तराई र भित्री मधेशको सिंचित तथा अर्धसिंचित क्षेत्र
७०	सुपर ११५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२०-१२५	५-६	तराई र भित्री मधेशको सिंचित तथा अर्धसिंचित क्षेत्र
७१	शान्तीF1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२०-१३०	५-६	तराई र भित्री मधेशको सिंचित क्षेत्र
७२	सुधा F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२५-१३०	५-६	तराई र भित्री मधेशको सिंचित क्षेत्र
७३	यु एस ३२३ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१५)	९२०-१३०	४-५	तराई र भित्री मधेशको सिंचित क्षेत्र
७४	यु एस ३८२ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७२ (२०१६)	९२०-१२५	५-६	तराई र भित्री मधेशको सिंचित क्षेत्र
७५	राधा १४	२०७३(२०१६)	९३२-१३५	४.४	तराई, भित्री मधेश, रिभर वेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
७६	सुगन्धित धान १	२०७३(२०१७)	९४२-१४५	४.५	तराई, भित्री मधेश, रिभर वेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
७७	राधा १३	२०७३(२०१७)	९४२-१४८	३-४.२	तराई र भित्री मधेशका असिंचित तथा समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर सम्मको नदी किनार, बैंसी तथा समतल फाँटर उपत्यकाका सिंचित क्षेत्र
७८	सेहराङ्ग सब १	२०७३(२०१७)	९२२-१२५	४.४-४.९	समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्री मधेश, नदी किनार, बैंसी तथा समतल फाट र उपत्यका सिंचित क्षेत्र
७९	जे.के.आर .एच२०८२ F1	२०७३(२०१७)	९३०	८.५-९	समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई, भित्री मधेश, नदी

	(पञ्जीकरण मात्र)				किनार,बैंसी तथा समतल फाट
द०	जे.के.आर .एच.३३३३ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१३५	६.०	समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाट
द१	एच.जे.-जि.१ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१२०-१२५	८-९	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
द२	एच.जे.-जि.५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१२०-१३०	७-८	समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाट
द३	एच.जे.-जि.१० F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१२०-१२५	८-९	समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाट
द४	बहुगुणी धान १	२०७४(२०१८)	१३५	५.५	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
द५	बहुगुणी धान२	२०७४(२०१८)	१४२	५.८	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
द६	हर्दिनाथ ३	२०७४(२०१८)	१२५	५.५	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
द७	चैते ५	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	४.६	समुद्र सतह देखी ७०० मिटर उचाईंसम्मको तराई, भित्रीमधेश, नदी किनार, बैंसी तथा समतल फाँट
द८	एल.जी.९३.०१ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	७.५-८	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
द९	एल.जी.९३.०२ F1	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	७.५-८	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाईं

	(पञ्जीकरण मात्र)				सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९०	साभा १२७ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११८	५.१६	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९१	साभा १३४ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११५-११८	५.६४	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९२	अराईज ६१२९गोल्ड F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११२-११५	६.५-७	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९३	अराईज प्राईमा F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१३०-१३५	७.५-८	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९४	भि.एन.आर २२३३ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	५.५-६.६	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी ढंगकिनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९५	भि.एन.आर २२४५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	५.५-६.६	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९६	डि.वाई ६८ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०	४.३-६.२	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९७	डि.वाई ७९ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२१	४.३-६.२	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,बैंसी तथा समतल फाँट
९८	कालो चामल (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	९९-१२५	२.२	तराई,भित्री मधेश,पहाड, उपत्यका र बैंसीहरु

१९	LPNBR 1605 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१५०	७.०	पूर्वी तथा मध्य तराई
१००	श्रीराम खुशु (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११८-१२९ ३२	५.२-६.२	तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,
१०१	एरिज अइडिया (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०-१२५	५.३-६.१	तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,
१०२	अल्ट्रा सुपर सम्पूर्ण (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१३५-१३७	४.०५- ४.५१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशतथा नदी किनार
१०३	अड्डुर ज्योतिका (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१३४	४.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०४	टि.एम. आर. एच. - १६२६ -पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१३४	५.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०५	मुकाबला २३ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२५	५.२	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०६	रज्जित -पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१५५-१६०	४.५-५.०	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०७	सावाँ मन्सुली (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१४५-१६०	५-६	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०८	सर्जु ५२(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२०-१३०	६-७	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१०९	सुपर चाईना ६०१ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२५	६.६	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११०	तहल्का F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२८ ३३	५.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
१११	महाराजा F1	२०७६	१३३	५.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई

	(पञ्जीकरण मात्र)	(२०१९)			सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११२	२७ पि ६३ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१३३	५.०	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११३	यू.एस. ३०५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१३२	५.०	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११४	९४४४F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२५	५.३८	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११५	के.पि.एच. ४६८F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२२	६.९९	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११६	पृथ्वी गोल्ड ११११F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२९	५.२	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११७	एम.आर.पि. ५५६९ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२६	६.३	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु
११८	एम.आर.पि. ५५६६ उपज F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२६	६.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको तराई,भित्री मधेशर बेंसीहरु

‘(ख) मकै

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पान्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	खुमल पहेलो	२०२२ (१९६५)	१२०-१३०	४.९	मध्यपहाड
२	रामपुर कम्पोजिट	२०३२ (१९७५)	११०-११५	४.४	तराई, भित्रीमधेश, बेंसी र मध्यपहाड
३	अरुण २	२०३९ (१९८१)	८०-९०	२.२	तराई, मध्यपहाड
४	मनकामना १	२०४४ (१९८७)	१२०-१३०	४.०	मध्यपहाड -हिउँदमा तराई क्षेत्रमा पनि लगाउन सकिने)
५	गणेश २	२०४६ (१९८९)	१५०-१८०	३.५	उच्च पहाड -हिउँदमा तराई र भित्रीमधेशमा पनि लगाउन सकिने)
६	रामपुर २	२०४६ (१९८९)	१०५-११०	४.०	तराई, भित्रीमधेश, बेंसी र टार
७	अरुण १	२०५२ (१९९५)	९.०-१००	४.०	पश्चिमतराई र मध्य पहाड
८	गणेश १	२०५४ (१९९७)	१७५	५.०	उच्च पहाड

९	मनकामना ३	२०५९ (२००२)	१४२	५.५	पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका मध्य पहाडी क्षेत्र (१००० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको उचाईको लागि)
१०	गौरव हार्डिङ मकै	२०६१ (२००३)	११०-१५०	८.१	तराई र भित्रीमधेस (हिउँदे खेतीको लागि)
११	देउती	२०६३ (२००६)	१३०-१३५	५.७	मध्यपहाड
१२	सितला	२०६३ (२००६)	१३०-१३५	६.०८	पहाड
१३	मनकामना ४	२०६५ (२००८)	११७	५.३	नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर भन्दा तल
१४	पोसिलो मकै १	२०६५ (२००८)	१४५-१५५	५.३	नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर भन्दा तल
१५	मनकामना ५	२०६६ (२०१०)	१४०-१४५	५.२७	कर्णाली पूर्वका मध्यपहाड
१६	मनकामना ६	२०६६ (२०१०)	१४०-१४५	५.३४	पूर्वी- मध्यपश्चिम पहाड
१७	बायो ९६८,F1 - पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९०-९१०	६.५-८	मध्यमाञ्चल पेत्रको मध्यपहाड- वर्षे मौसम पूर्वी तराई- हिउँदे मौसम
१८	राजकुमारF1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७(२०१०)	१००-११०	८-९	तराई,भित्री मधेश, रिभर वेसिन, भ्याली र तल्लो पहाडी भेगको ७०० मिटर उचाई सम्म
१९	नुतन -के.एच १०१, F1) (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७(२०१०)	९०-९२	६.५-८	तराई, भित्री मधेश, रिभर वेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
२०	डिकेसी १०८१, F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०११)	१२०-१६०	१०-१२	मध्य तराई – हिउँदे मौसम -कार्तिक – माघ)
२१	अल राउण्डर, F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०११)	१२०-१६०	७-१०	तराई क्षेत्रमा – हिउँदे तथा वर्षे मौसम
२२	विस्को – १४० F1 - पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	१३५-१४० ३५	७.१३	मध्य तराई र पहाड
२३	सि – १९२१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	१४०-१६७ (Winter) १०५-११० (Rainy)	५.१४-७.५	पुर्व तथा मध्य तराई र मध्य पहाडको बेसी तथा टार ।
२४	सि. पि. -८०८, F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	१३०-१४० (Winter) ११०-१२० (Rainy)	९.९५	पुर्व तथा मध्य तराई
२५	सि. पि. -६६६ ,F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	११०-१२०	६.९७	पुर्व तथा मध्य तराई
२६	गोदावरी -९८९, F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६८(२०११)	१०५	७.३६	पुर्व तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेसी तथा टार ।

२७	अर्ली – २, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६८ (२०११)	१०५	५.६९	पुर्व तथा मध्य तराई, र मध्य पहाड़को बेसी तथा टार।
२८	रामपुर हाईब्रिड – २	२०६९ (२०१२)	१३०–१६० हिउदे १२५ वर्षे	७.० हिउदे ३.५५ वर्षे	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
२९	आर. एम. एल.– ४ (Inbred line)	२०६९ (२०१२)			नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३०	एन. एम. एल.– २ (Inbred line)	२०६९ (२०१२)			नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३१	आदित्य–९२९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	१२१ (Days to silking)	७.२	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३२	प्रोएग्रो– ४६४२, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११५ (Days to silking)	८.२९	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३३	विस्को– ९४० नयाँ, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११९ (Days to silking)	७.७४	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३४	सि. पी.– ८३८, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११९ (Days to silking)	७.११	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३५	१० भि १०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११६ (Days to silking)	७.४६	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३६	डि. एम. एच.– ७३१४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	१२३ (Days to silking)	६.६६	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३७	डि. एम. एच.– ८४९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११३ (Day ३६ silking)	६.६५	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३८	एम. एम.– ११०७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	१२३ (Days to silking)	९.०	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
३९	डेकाल्ब डबल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११८ (Days to silking)	६.७९	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
४०	एन. एम. एच.– ७३१ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११५ (Days to silking)	७.९२	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
४१	पायोनियर–३५२२, F1	२०६९ (२०१२)	१२२ (Days to silking)	८.६५	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई

	(पञ्जीकरण मात्र)				
४२	९२२०, F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११७(Days to silking)	७.६७	तराई, भित्री मधेश, रिभर वेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
४३	टि.एक्स -३६९, F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	१२४(Days to silking)	९	तराई, भित्री मधेश, रिभर वेसिनर उपत्यकाको ७०० मिटर उचाई सम्मको
४४	सि.-१९४६,F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	११६(Days to silking)	९.७	नारायणी नदि पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई
४५	खुमल हाईब्रिड मर्के - २	२०७१ (२०१४)	१५२- Winter १३८-Summer	९.०८ ८.५	मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षा याममा र तराई तथा भित्री मधेसमा हिउदे मौसममा ।
४६	के वाई एम - ३३	२०७१ (२०१४)	६८ (Days to silking)	२.५	मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षा याममा र तराई तथा भित्री मधेसमा हिउदे मौसममा ।
४७	के वाई एम - ३५	२०७१ (२०१४)	६६ (Days to silking)	१.५	मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षा याममा र तराई तथा भित्री मधेसमा हिउदे मौसममा ।
४८	रेशुज्जा कम्पोजीट	२०७१ (२०१४)	१२७	५.२	मध्य तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १४०० मिटर उचाइको पहाडी क्षेत्र ।
४९	गुल्मी - २ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	१२५	५.४	गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाको ७०० देखि १४०० मिटर उचाइको क्षेत्र ।
५०	अरुण ३	२०७२ (२०१५)	१००	३.९	मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड । तराई र भित्री मधेशमा हिउदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेदघीगर्न सकिने ।
५१	ऋरुण ४	२०७२ (२०१५)	११३-११५	४.२	मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड । तराई र भित्री मधेशमा हिउदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेदघीगर्न सकिने ।
५२	अरुण ६	२०७२ (२०१५)	९०	३.५ ३०	मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड । तराई र भित्री मधेशमा हिउदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेदघीगर्न सकिने ।
५३	रामपुर हाईब्रिड ४	२०७३(२०१६)	१५५-१६५	६.९५	तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटर सम्म
५४	आर.एम.एल.३२ (ईनब्रेड लाईन)	२०७३(२०१६)			तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटर सम्म
५५	आर.एम.एल.१७ (ईनब्रेड लाईन)	२०७३(२०१६)			तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटर सम्म
५६	रामपुर हाईब्रिड ६	२०७३(२०१६)	१५८-१६५	६.८	तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजन

					७०० मिटर सम्म
५७	आर.एम.एल.४ (इनब्रेड लाईन)	२०७३(२०१६)			तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजन ७०० मिटर सम्म
५८	जि.के. ३१४०F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७५	६.४	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
५९	जि.के. ३११४F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७०	६.५	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६०	एन.एम.एच. ७५३F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७५	६.३	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६१	एन.एम.एच. १२४७F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७७	६.०७	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६२	पि.३३९६F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१६५	६.२९	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६३	३०२२F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७०	६.३	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६४	३०३३F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७०	६.४	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६५	विस्को एक्स ८१F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१७५	९.६	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६६	विस्को ९७ गोल्ड F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१६)	१ ३८	८.२	नारायणी नदी देखी पूर्वी तराई र भित्री मधेशको हिउदे सिजनको लागी ७०० मिटर सम्म
६७	९०० एम.गोल्ड F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१८०	६.५	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागी
६८	परबल F1,(पञ्जीकरण	२०७३(२०१७)	१८०	६.१	समुन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाई सम्मको नारायणी नदी

	मात्र				पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागी
६९	पोषिलो मैके २	२०७४(२०१८)	१२०-१६०	४.५	तराई, भित्री मधेशको समुन्द्र सतहदेखि ८०० मीटरसम्म (वर्षे तथा हिउदे सिजनको लागी) र मध्य पहाडको समुन्द्र सतहदेखि ८००-१८०० मीटर उचाईसम्म (वर्षे सिजनको लागी)
७०	रामपुर ४	२०७४(२०१८)	१७०	५.४०	तराई, भित्री मधेशको समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्म
७१	मनकामना ७	२०७४(२०१८)	१५८	६.४६	मध्य पहाडको समुन्द्र सतहदेखि ७००-१६०० मीटर उचाईसम्म
७२	रामपुर हाईब्रिड F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११०-१५५	७.५६	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मका तराई, भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७३	रामपुर हाईब्रिड १०F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१२०-१६०	८.०५	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मका तराई, भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७४	पि एल २३००F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	८.४८	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७५	पि एल २३३F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	९.०१	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७६	एच पि २२२ F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६० ३८	८.७४	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७७	९७८ F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१४०-१५०	७.८१	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७८	९५१ सुपर F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१५५-१६०	७.२७	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउदे सिजनको लागि
७९	पि ३५३३F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१७०	७.५५	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मीटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई

					र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८०	एल जी ३३.०९F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	८.१	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८१	विस्को जम्बो ६५F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	८.१७	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८२	जे के एम एच ५०२F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	११५	७.०९	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८३	कर्न किंग ९५२२ (एम ९२९२),F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	७.२२	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८४	सुप्रिम ९०६२ (विकास)F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१६०-१६५	७.१२	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८५	जे एम १F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१४०-१५०	७.२१	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि
८६	जे एम ४F1,(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४(२०१८)	१४०-१५०	७.२०	समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मको नारायणी नदी पूर्वका तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै सिजनको लागि

(ग) गहुँ

क्र.सं .	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	बी.एल. १०२२	२०४८ (१९९१)	१२०	५.०	नारायणी नदीदेखि पश्चिमको तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु
२	भृकुटी	२०५१ (१९९४)	१२०	५.०	तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु
३	बी.एल. ११३५	२०५१ (१९९४)	११५	५.०	तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु
४	अच्युत	२०५४ (१९९७)	१२५	४.५	टार, १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यकाको मध्यम तथा उच्च उर्वराभूमि
५	रोहिणी	२०५४ (१९९७)	११९	४.१	तराई, टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यकाको सिङ्घित र मध्यम तथा उच्च उर्वराभूमि

६	पासाङ्गलामु	२०५४ (१९९७)	१७८	६.७	मध्यपहाड जस्तै काठमाडौं र जुम्ला सरहको समान हावापानी भएको उच्च पहाड
७	कान्ति	२०५४ (१९९७)	१७४	५.५	पहाडी क्षेत्रको मध्यम र उच्च उर्वरा भूमि
८	बी.एल. १४७२	२०५६ (१९९९)	११५	४.०	तराई, टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाई भएका उपत्यकाको सिंचित र मध्यम तथा उच्च उर्वराभूमि
९	गौतम	२०६१ (२००४)	११९	३.४	तराई, टार तथा ५०० मिटर भन्दा कम उचाई भएको उपत्यका
१०	डब्लु के १२०४	२०६४ (२००७)	१७९	३.४	मध्य पहाड र उच्च पहाड
११	आदित्य	२०६६ (२०१०)	११८	४.७९	तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
१२	एन.एल. १७१	२०६६ (२०१०)	१२२	४.५३	तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
१३	विजय	२०६७ (२०११)	११९-१२३	४.४५	तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
१४	गौरा (BL 3235)	२०६९ (२०१२)	१६०	४.२-५.०	मध्य तथा उच्च पहाड
१५	घौलागिरी (BL 3503)	२०६९ (२०१२)	१५६	३.६-४.९	मध्य तथा उच्च पहाड
१६	तिलोत्तमा	२०७२ (२०१५)	१०५-१२०	२.५-३.२	तराई र भित्री मधेसको सिंचित तथा अर्ध सिंचित क्षेत्र
१७	डाँफे	२०७२ (२०१५)	१६३-१७०	४.४८	मध्य तथा उच्च पहाड
१८	बाणगंगा	२०७३(२०१६)	११०	३.३	तराई, टार, हाचो उपत्यका ७०० मिटरसम्मको उचाईमा सिंचित र अर्ध सिंचित क्षेत्रको लागी
१९	स्वर्गद्वारी	२०७३(२०१६)	१६३	४.४	मध्य तथा उच्च पहाड (७०० देखि १४०० मिटरसम्म) सिंचित तथा अर्ध सिंचित क्षेत्रको लागी
२०	मुनाल	२०७४(२०१८)	१६४ ४१	४.९१	समुद्र सतहको ६०० देखि २३०० मि. उचाईसम्मको मध्य तथा उच्च पहाडको सिंचित तथा अर्सिंचित क्षेत्र
२१	च्याखुरा	२०७४(२०१८)	१५८	३.२६	समुद्र सतहको ६०० देखि १६०० मि. उचाईसम्मको मध्य पहाडको अर्सिंचित क्षेत्र
२२	खजुरा ड्युरम १	२०७४(२०१८)	१२६	४.८६	समुद्र सतहदेखि ५०० मिटर उचाईसम्मका दाढ, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका सिंचित क्षेत्र
२३	खजुरा ड्युरम २	२०७४(२०१८)	१२९	५.२६	समुद्र सतहदेखि ५०० मिटर उचाईसम्मका दाढ, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका सिंचित क्षेत्र
२४	पावै गहू -दर्ता)	२०७५(२०१८)	३३०	२.१९-२.७५	कर्णाली अंचलको २३०० देखि ३३०० मिटर सम्म । २८०० मिटर उपयुक्त ।
२५	वि.एल. ४३४१	२०७५(२०१८)		५.०३	तराई र भित्री मधेश लगायत समुन्द्री सतह बाट ८०० मिटर उचाई सम्म ।

(घ) कोदो

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ओख्ले १	२०३७ (१९८०)	१५४-१९४	३.३	मध्य र उच्च पहाड
२	डल्ले १	२०३७ (१९८०)	१२५-१५१	३.३	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड
३	काब्रे कोदो १	२०४७ (१९९०)	१६७	२.३	९०० मिटरदेखि १९०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रको पाखोबारी
४	सैलुड कोदो १	२०७२ (२०१५)	१५५	२.४	मध्यमाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको १३०० देखि २२०० मि. उचाईको मध्य पहाड र उच्च पहाड
५	काब्रे कोदो २	२०७२ (२०१५)	१५३	२.५	मध्यमाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १६०० मि. उचाईको मध्य पहाड

(ङ) जौ

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	बोनस	२०३० (१९७४)	१६२	३.६	काठमाडौ उपत्यका र समान हावापानी भएको क्षेत्र
२	एच.बी.एल ५६	२०३० (१९७४)	१३५	३.०	तराई र भित्रीमधेश
३	गाल्ट	२०३० (१९७४)	१५७	२.३	तराई, भित्रीमधेश र पालुङ्ग उपत्यका
४	सि.आई. १०४४८	२०३० (१९७४)	१२५	२.६	तराई र भित्रीमधेश
५	केच	२०३१ (१९७५)	११२	२.५	तराई र भित्रीमधेश
६	सोलुउवा	२०४७ (१९९०)	१७७	१.९	मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग र डोल्पाका २००० मिटर देखि ३००० मिटरसम्म उचाईका लेकाली क्षेत्र

(च) फापर

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष			सिफारिस क्षेत्र
१	मिठे फापर १	२०७२ (२०१५)	७२	१.२	तराई र भित्री मधेसदेखि उच्च पहाडसम्म

२. दलहन

(क) भटमास

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	हार्डी	२०३५ (१९७७)	१२४	२.४	तराई र भित्रीमधेश
२	रान्सम	२०४४ (१९८७)	१४५	१.०	मध्यपहाड र उपत्यका
३	सेती	२०४६ (१९९०)	१५०	१.२	मध्यपहाड र उपत्यका
४	कव	२०४६ (१९९०)	१२३	२.५	तराई र भित्रीमधेश
५	लुम्ले भटमास १	२०५३ (१९९६)	१३८-१४७	१.७	४०० मिटरदेखि १६०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाड
६	तरकारी भटमास १	२०६० (२००४)	१२०	२.३	मध्यपहाडी क्षेत्र ८०० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्म
७	पूजा	२०६३ (२००६)	१२५	१.६	तराई, भित्रीमधेश र मध्य पहाड

(ख) मुसुरो

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	सिन्दुर	२०३६ (१९७९)	१४८	१.५	तराई, भित्रीमधेश र पहाड
२	सिप्रिक	२०३६ (१९७९)	१४३	१.५	तराई, भित्रीमधेश र पहाड
३	शिशिर	२०३६ (१९७९)	१५०	२.०	तराई, भित्रीमधेश र पहाड
४	सिमल	२०४६ (१९९०)	१४३	४.९ ४३	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड
५	शिखर	२०४६ (१९९०)	१४३	३.५	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड
६	खजुरा १	२०५६ (१९९९)	१२८	१.५	मध्यपश्चिमाञ्चल देखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाइने खेत
७	खजुरा मुसुरो २	२०५६ (१९९९)	१३४	२.१	मध्यपश्चिमाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाइने खेत
८	शितल	२०६१ (२००४)	१३४	१.१	सम्पूर्ण तराई र मध्यपहाड
९	महेश्वर भारती	२०६४ (२००७)	१११	१.४	काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह, मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा वेसी

१०	सगुन	२०६४ (२००७)	९८	१.३	काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह, मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा बेसी
११	खजुरा मुसुरो ३	२०७३ (२०१७)	१४८	१.७८	समुन्द्र सतहबाट १७०० मिटर सम्मको तराई भित्री मधेश र मध्य पहाड
१२	खजुरा मुसुरो ४	२०७५-२०१८_	१३६	१.०८	मध्य तथा सुदूर पश्चिमका तराई (दाङ देखि कञ्चनपुर सम्म, १०० देखि ७०० मिटर सम्म)

(ग) चना

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	धनुष	२०३६ (१९७९)	१४४	१.८	तराई र भित्रीमधेश
२	राधा	२०४४ (१९८७)	१४२	१.६	तराईका सुख्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भूमि
३	सीता	२०४४ (१९८७)	१४०	१.५	तराईका सुख्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भूमि
४	कोशेली	२०४७ (१९९०)	१५४	१.६	पश्चिम तराई र भित्रीमधेश
५	कालीका	२०४७ (१९९०)	१५२	१.४	मध्य र पश्चिम तराई तथा भित्रीमधेश
६	तारा	२०६४ (२००८)	१३५	१.४	तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार
७	अवरोधी	२०६४ (२००८)	१३५	१.३	तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार

४४

(घ) बोडी

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	आकाश	२०४६ (१९९०)	७३	१.०	तराई र भित्रीमधेश
२	प्रकाश	२०४६ (१९९०)	६०	०.८	तराई र भित्रीमधेश
३	सूर्य	२०६१ (२००४)	७७	१.३	मध्य र पश्चिम तराई, भित्रीमधेश
४	डवल हार्मेस्ट OP	२०६६ (२०१०)	७०-१००	१६-१८	तराई र पहाड

	(पञ्जीकरण मात्र)				
५	मालेपाटन - १	२०६८(२०११)	७५-९०	०.८-१.०	तराई, भित्रीमधेस तथा मध्य पहाड़का टार तथा होचा क्षेत्रहरु (३०० देखि १००० मी)
६	गाजले बोडी	२०७३	७८	१.८५	समुन्द्र सतहबाट १२०० मिटर सम्मको तराई भित्री मधेश र मध्य पहाड

(ड) रहर

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	रामपुर अरहर १	२०४८ (१९९२)	१९७	१.५	चितवन, मकवानपुर र सर्लाही जिल्लाहरुको तराई र भित्रीमधेश
२	बागेश्वरी	२०४८ (१९९२)	२६१	२.०	घनुपा, सर्लाही र बाँके जिल्लाहरु

(च) मास

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	रामपुर मास	2075-2018_	६४	०.८८	तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाड़का टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि १२५० मिटर सम्म)
२	खजुरा मास १	2075 -2018_	६६	०.८९	तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाड़का टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि १२५० मिटर सम्म)

(छ) मुङ्ग

४५

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पुसा वैशाखी	२०३२ (१९७६)	६०	१.५	तराई
२	कल्याण	२०६३ (२००६)	६०	०.६९	तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड
३	प्रतिक्षा	२०६३ (२००६)	६३	०.६८६	तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड
४	प्रतिज्ञा	२०७५ (२०१८)	५९	१.३०	तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाड़का टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि ७०० मिटर सम्म)

--	--	--	--	--	--

(ज) राजमा

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पि.डि.आर. १४	२०७६ (२०१९)	११९	१.८६	तराईदेखि उच्च पहाड (११५ देखि २३६७ मिटरसम्म)

३. तेलहन

(क) बदाम

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	वी. ४	२०३७ (१९८०)	१४०	१.५	तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड
२	जनक	२०४५ (१९८९)	१४५	२.५	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको सिंचाईको सुविधा नभएको बलौटे दोमट माटो भएको क्षेत्र
३	ज्योती	२०५३ (१९९६)	१३७-१५३	२.०	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो नभएको क्षेत्र
४	जयन्ती	२०५३ (१९९६)	११५	२.२	तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो नभएको क्षेत्र
५	राजर्पि	२०६२ (२००५)	१३८	२.८४	तराई र भित्री मधेस
६	वैदेही	२०६२ (२००५)	११०	३.३	तराई र भित्रीमधेस
७	समृद्धि	२०७६ (२०१९)	११०-१२५	३.१६	तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड

४६

(ख) तोरी

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	विकास	२०४६ (१९८९)	८५-९०	०.८	मध्यमाञ्चलदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चलसम्मको तराई र

					भित्री मधेश
२	लुम्ले १	२०५३ (१९९६)	८९-१५३	०.९	पश्चिम क्षेत्रको ७०० मिटर उचाईभन्दा माथिको मध्यदेखि उच्च पहाड
३	प्रगति	२०५३ (१९९६)	९९	१.०	पूर्वी मध्यपहाड, तराई र भित्रीमधेशको असिङ्गत भूमि
४	उन्नति	२०६२ (२००५)	८६	१.०४	तराई, भित्री मधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिङ्गत क्षेत्र
५	प्रीति	२०६२ (२००५)	८३	१.२६	तराई, भित्रीमधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिङ्गत क्षेत्र
६	मोरड तोरी - २	२०७० (२०१३)	८३	०.७ -०.९	तराई तथा मध्य तराई
७	जे वाई - १६, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	९६०	१.८	तराई तथा भित्री मधेशको सिंचीत तथा अर्घ सिंचीत क्षेत्र
८	सुखेत स्थानिय तोरी - ३ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	८२-१००	०.९०५	मध्य पश्चिमका तराई जिल्लाहरु बाँके, बर्दिया, दाढ, मध्य पहाडका, सुखेत, दैलेख सल्यान र भेरी नदि किनारका क्षेत्रहरु ।
९	नवलपुर स्थानिय ४	२०७६ (२०१९)	९३	१.०२	तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडका ६०० मिटर

(ग) रायो

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पुसा बोल्ड	२०४५ (१९८९)	११०-११५	०.९	तराई र भित्रीमधेश
२	कृष्णा	२०४६ (१९९०)	११५	१.१	मध्यमाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको तराई र भित्रीमधेश
३	मोरङ्ग रायो/तोरा	२०७४ (२०१८)	१०२-१२०	०.९२	समन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मका तराई तथा भित्री मधेश

(घ) तील

४०

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र

१	नवलपुर खेरो तील १	२०५७ (२०००)	८५	१.२	सिरहादेखि नेपालगञ्जसम्मका तराई
२	नवलपुर झुसे तील १	२०५७ (२०००)	१.३	०.६५	तराई र भित्रीमधेश

४. औद्योगिक बाली

(क) जुट

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	इटहरी १ (सेतोपात)	२०५६ (१९९९)	११८	३.४	पूर्वी तराई
२	इटहरी २ (सुनौलो पात)	२०५६ (१९९९)	११६	३.३	पूर्वी तराई

(ख) अदुवा

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कपुरकोट अदुवा १	२०५८ (२००१)	२२५-२४०	२२-३८	१६०० मिटर उचाईसम्मको भित्रीमधेश, मध्यपहाड र बेसी
२	कपुरकोट अदुवा २	२०७३(२०१६)	२४०-२६०	३२.७५	भित्री मधेश, मध्य पहाड र बेसी १६०० मिटर उचाई सम्म

(ग) हलेदो/बेसार

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कपुरकोट हलेदो - १	२०७१ (२०१४)	२४५ -२६०	२७.८	मध्य पहाडको असिन्चीत पाखोबारी
२	कपुरकोट हलेदो - २	२०७४ (२०१८)	२४५ -२६०	३४.०५	समुन्द्र सतहदेखि १६०० मिटर उचाईसम्मका तराई तथा भित्री मधेश

५. तरकारी बाली

(क) आलु

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाकने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कुकी ज्योति	२०४९ (१९९२)	११०	२३	पहाडमा वर्षे बालीको लागि माघ, फालुण र चैत्र, हिउदेवालीको लागि असोज र कार्तिकमा तथा कम वर्षा हुने पश्चिमका उच्च पहाडका लागि असार र साउन
२	कुकी सिन्दुरी	२०४९ (१९९२)	११०-१२०	२३	तराईमा हिउदेवालीको रूपमा, असोजदेखि मंसिरसम्म र तल्लोपहाडी भेगमा कार्तिकदेखि पुससम्म
३	डेजिरे	२०४९ (१९९२)	९०-१२०	१८	तराईमा हिउदेवालीको रूपमा असोज र कार्तिक, मध्यपहाड र तल्लोपहाडमा भाद्र र असोज तथा मध्य पहाडदेखि उच्च पहाडमा वर्षेबालीको रूपमा माघ र फागुन
४	जनकदेव	२०५६ (१९९९)	११०	३९.४	मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गृष्म ऋतु, उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा शरद ऋतु र कम पानी पर्ने उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षा ऋतु
५	खुमल सेतो १	२०५६ (१९९९)	११०	३८.७	मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गृष्म ऋतु, कम पानी पर्ने उच्च पहाडी क्षेत्रमा र मध्यपहाडी क्षेत्रमा शरद ऋतु
६	खुमल रातो २	२०५६ (१९९९)	९५	३६.२	तराई, भित्रीमधेश तथा खोंचहरूमा शरद ऋतु
७	खुमल लक्ष्मी	२०६५ (२००८)	१२०-१४०	२४-२८	मध्य तथा उच्च पहाडी भेग – वर्षे बाली, सुख्खा उच्च पहाडी भेग – मनसून बाली, तराई तथा भित्री मधेश – शरद तथा हिउदेवाली
८	आई पी वाई ८	२०६५ (२००८)	११०-१२०	२५-२७	तराई तथा भित्री मधेश
९	खुमल उज्ज्वल	२०७१ (२०१४)	१०० □ १२०	२५	मध्य पाहाड देखि उच्च पहाडी क्षेत्र
१०	खुमल उपहार	२०७१ (२०१४)	१०० -१२०	२४	तराई र मध्य पहाडको १२०० मिटर उचाइ सम्म ।
११	टि पि एस - १ - पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	११० -१२०	३५ -४०	तराई र मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
१२	टि पि एस - २ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	११० -१२०	३० -३५	तराई र मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
१३	खुमल विकास	२०७५(२०१८)	१००-११०	२५.७५	मध्य पहाड देखि उच्च पहाडी क्षेत्र (१२०० मिटर देखि ३००० मिटर सम्म
१४	कार्डिनल (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	८०-११०	१८-३०	तराईदेखि पहाड सम्म -करिव १०० देखि ४००० मि. सम्म)
१५	रोजिटा (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	१२०-१४०	१०-१४	मध्य र पूर्व उच्च पहाडी क्षेत्र (१६०० देखि ३५०० मि. सम्म)
१६	एम.एस.४२.३(२०७६ (२०१९)	१००-१२०	१०-२४	तराईदेखि पहाडी उपत्यका तथा खोंच (१०० देखि १६०० मि.

	पञ्जीकरण मात्रा)				सम्म)
--	------------------	--	--	--	-------

(ख) काउली

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाकने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	काठमाडौं स्थानीय	२०४६ (१९९०)	११०-१२०	२५.०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२	डोल्पा स्नोवल	२०५१ (१९९४)	११०-१२०	१५	तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाड
३	सर्लाही दिपाली	२०५१ (१९९४)	५५-६०	८.०	तराई र मध्यपहाड
४	एन एस ६० एन, F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	५५-६०	२६-३०	तराई र पहाड
५	एन एस १०६ ,F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७०-७५	२८-३४	तराई, पहाड र उच्च पहाड
६	एन एस ९० ,F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	९०-९५	४०-६०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
७	अन्ना ९०, F ₁ (पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	९०	४५-५६	तराई, पहाड र उच्च पहाड
८	अन्ना कप, F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	६०	३०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
९	रेनी , F ₁ (पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	८१	३६-४०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
१०	डमी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७०	४०-४४	तराई, पहाड र उच्च पहाड
११	युमिको ,F ₁ (पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७५	२६-३०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
१२	स्नो बेप्ट F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७०-७५	३०-४०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
१३	ह्वाईट ईजन्याएड F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	५०-५५	३३	तराई र मध्ये पहाड
१४	ह्वाईट फ्ल्यास, F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	११०	४५	मध्ये पहाड
१५	मिल्कीवे, F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	१२०	५२.५	पहाड र उच्च पहाड
१६	कासमिरे, F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	११०	५२.५	तराई र मध्ये पहाड
१७	क्यान्ड चार्म F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	११०	५२.५	तराई र मध्ये पहाड
१८	युकोनF ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	११०	५६	तराई र मध्ये पहाड
१९	नेपा ह्वाईटF ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	१००	३८	तराई र मध्ये पहाड
२०	स्नो क्राउन F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७०	२२-२५	तराई र पहाड
२१	स्नो मिस्टीक F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	८०	३५-४०	तराई र पहाड
२२	स्नो ग्रेस F ₁ -पञ्जीकरण मात्रा)	२०६६ (२०१०)	७३	३५-४०	तराई र पहाड

२३	नेपा ६०, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५५	२६-२८	तराई र पहाड
२४	स्नो क्वीन, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०	२०-२२	तराई र पहाड
२५	स्नो डोम F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८५	४०-४५	तराई र पहाड
२६	स्नो मार्च, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१८०	५०-५५	तराई र पहाड
२७	ह्वाईट कप , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०-५५	१५-१६	तराई र पहाड
२८	ह्वाईट किड ,F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१८० ५०	१८-२०	तराई र पहाड
२९	ह्वाईट कलाउड, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५	२२-२३	तराई र पहाड
३०	ह्वाईट डायमण्ड , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८०-८५	३६	तराई र पहाड
३१	स्नो मून,F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९०-१००	४०-४४	तराई र मध्यपहाड
३२	सिल्भरकप ६०, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	२४-३०	मध्यपहाड र तराई
३३	सिल्भरमून ६० , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	२०-२६	मध्यपहाड र तराई
३४	रेमी , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	२४-३०	मध्यपहाड र तराई
३५	ह्वाईट टप, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९०	४२	मध्यपहाड र तराई
३६	सुपर ह्वाईट टप, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९५	५६	मध्यपहाड र तराई
३७	देवि १, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९५	४९	मध्यपहाड र तराई
३८	देवि २, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	११५	४८	मध्यपहाड र तराई
३९	एन २२, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	१३०	६०	मध्यपहाड र तराई
४०	मनास्लु, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	८०	२८	मध्यपहाड र तराई
४१	निम्पु , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	८०	२८	मध्यपहाड र तराई
४२	ह्वाईट मुन, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	१२५	४८	मध्यपहाड र तराई
४३	८०४,, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९०	२८	मध्यपहाड र तराई
४४	ह्वाईट स्नो, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	५५-६०	२२.९	तराई, भित्रि मधेश र पहाड
४५	मेघा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	४०-५०	तराई र मध्य पहाड
४६	अल द राउण्ड, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	१३०	१५-२०	तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड
४७	स्नो वेभ F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	५०-५५	तराई र मध्य पहाड

४८	जुली F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५०-५५	३५-४०	तराई र मध्य पहाड
४९	फुजिएमा F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	७०-८५	३५	तराई र मध्य पहाड
५०	खुमल ज्यापू	२०७२ (२०१५)	६५-८०	२९.७	मध्य पहाडी क्षेत्र
५१	बर्खा F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	६०-६५	३४-३९	मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
५२	गिरिजा F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	८५-९०	४४	मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
५३	विस्टलर F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	७७-८०	३६	तराईको सिंचित क्षेत्र

(ग) मूला

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाकने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	मिनोअर्ली	२०४६ (१९९०)	४०-४५	२६	तराई, पहाड र उच्च पहाडको सिंचित भूमि
२	ह्वाइट नेक	२०५१ (१९९४)	६०-६५	३५	मध्यपहाड
३	प्युठाने रातो	२०५१ (१९९४)	७०-८०	४३	मध्यपहाड
४	चालीस दिने	२०५१ (१९९४)	३५-४५	२८	तराई र मध्यपहाड
५	टोकिनासी(पञ्जीकरण मात्र)	२०५१ (१९९४)	५२-६०	३१	११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
६	धनकुटे(पञ्जीकरण मात्र)	२०५१ (१९९४)	५५-६०	४२	११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
७	अल सिजन ह्वाईट (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	७०	२०-३०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
८	मिनोअर्ली लड ह्वाईट (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	५५-६०	२०-३०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
९	वाइ आर ह्वाईट स्प्रिङ F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	४०-८०	तराई र पहाड
१०	मिनोअर्ली लड ह्वाईट F ₁ - पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५५-६०	४०-६०	तराई र पहाड
११	एनी सिजन,(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५	४०-६०	तराई र पहाड
१२	ग्रीन बो, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	७०	४०-६०	तराई र पहाड

१३	ट्रिपिकल क्स, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	४०-६०	तराई र पहाड
१४	ग्रिन नेक, OP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४०-५०	५-७	मध्य,पहाड र तराई
१५	लड ट्वार्ड सिनोङ्ग, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०	४०-६०	मध्य पहाड
१६	सिन्जीन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६५	४०-४५	मध्य पहाड
१७	बि एन ४२९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०	४०-४५	मध्य पहाड
१८	रकि - ४५ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५-५० १४०	४४-५० ०.८-०.९ बीउ	तराई र मध्यपहाड

(घ) सलगम

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पर्पल टप	२०४६ (१९९०)	६०-७०	२३	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२	फुयुनोसो , F1, (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	१०-१८	मध्यपहाड र तराई
३	काठमाण्डौ रातो	२०७३	६५	३०.६०	समुन्द्र सतहबाट १००० देखि १५०० मिटर सम्मको मध्य पहाड

(ङ) रायो साग

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र

१	खुमल चौडापात	२०४६ (१९९०)	५०-६०	३५.०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२	मार्फा चौडापात	२०५१ (१९९४)	५५-६५	२८.०	मध्यपहाड र उच्च पहाड
३	खुमल रातोपात	२०५१ (१९९४)	६०-७०	२८.०	मध्यपहाड र उच्च पहाड
४	ताङ्खुवा रायो	२०५१ (१९९४)	३०-३६	३१.०	११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
५	माईक जायन्ट, OP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-४०	१	तराई र पहाड
६	रेड जायन्ट, OP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-४०	१	तराई र पहाड
७	गुजमुज्जे रायो (पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	२४० -२७०	२ . Seed ३० Fresh	समुन्द्र सतहबाट १५०० देखि १८०० मिटर सम्मको पहाडी क्षेत्र ।
८	झुडे रायो (पञ्जीकरण मात्र)	२०७१ (२०१४)	२४०	२. Seed ३५ Fresh	समुन्द्र सतहबाट १५०० देखि १८०० मिटर सम्मको पहाडी क्षेत्र ।

(च) प्याज

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	रेड क्रियोल	२०४६ (१९९०)	६०	१५	तराई, पहाड र उच्च पहाड तीनै भौगोलिक क्षेत्रमा क्रमशः कार्तिकदेखि मार्सर, भाद्रदेखि कार्तिक र फागुनदेखि चैत्रसम्म लगाउने
२	सुपरेक्स् F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१३०-१५०	३५-३८	तराई र पहाड
३	टि आई १७२ ,F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१३०-१५०	३२-३५	तराई र पहाड
४	भेनस, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३००	४५	तराई र पहाड
५	विन्टर सिल्भर, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३००	४५	तराई र पहाड
६	कास, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	२५०	६०	तराई र पहाड
७	नासिक – ५३(पञ्जीकरण मात्र)	२०६८	१३०-१६५	१६.६-२०.०	तराई र मध्य पहाड

(छ) गोलभेडा

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पुसारुवी	२०४६ (१९९०)	६०	१५.०	तराई र पहाड

२	रोमा	२०५१ (१९९४)	६५-७०	१२-१५	तराई र मध्यपहाड़
३	मनप्रेक्ष	२०५१ (१९९४)	८०-९०	२०-४०	मध्य र उच्च पहाड़
४	एन.सी.एल. १	२०५१ (१९९४)	६५-७०	२०-३०	तराई र मध्यपहाड़
५	सृजना, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-८०	१०५-११०	मध्यपहाड़: ८०० मि.देखि १६०० मि. तराई: १५० मि. माथि
६	गौरव ५५५, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१००-१०५	१०६	तराई तथा मध्य पहाड़
७	अमिता , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९५-१००	९६.२	तराई तथा मध्य पहाड़
८	एन एस ८१५, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-८०	८०-९०	तराई र पहाड़
९	एन एस ७१९, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७८-८०	८०-९०	तराई र पहाड़ तथा रिभर वेसिन
१०	स्वरक्षा , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	८०-९०	तराई र पहाड़
११	एन एस २५३५, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	१४०-१५०	तराई र पहाड़
१२	एन एस ५३, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८०-८५	९०-१००	तराई र पहाड़
१३	युरेका , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०२	९३.७	तराई र पहाड़
१४	साभेरा , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०५	९१३	तराई र पहाड़
१५	जिको , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०४	१४०	तराई र पहाड़
१६	सेन्स् , F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०७	११५	तराई र पहाड़
१७	सेरेस, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९१२	१०५	तराई र पहाड़
१८	स्पेक्ट्रा, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०९	१२२	तराई र पहाड़
१९	एस्ट्रा ७१७, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०३	१३१	तराई र पहाड़
२०	नोभा, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०७	१५२	तराई र पहाड़
२१	मारिना, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०५	११३	तराई र पहाड़
२२	भि एल ४४३, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०४	१४०	तराई र पहाड़
२३	माकिस, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०-७०	३०	तराई तथा मध्यपहाड़
२४	दलिला, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०-७०	३०	तराई, मध्य तथा उच्चपहाड़

२५	टी. - ३०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९(२०१२)	६०-६५	५७	तराई भित्री मधेस र पहाड
२६	सुर्य - १११ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	१००-१०५	६०.५	तराई र मध्य पहाड
२७	अमरुता F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-७०	४०-५०	तराई क्षेत्र
२८	मिन्टो F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	१००-१२०	तराई र मध्य पहाड
२९	अभिलाषF1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)		७९	तराईको सिंचित क्षेत्र
३०	अभिल फ1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)		८३	तराईको सिंचित क्षेत्र
३१	रेड कभर F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	७०-८०	७५-८५	तराईको सिंचित क्षेत्र
३२	रेड ग्लोरी F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	७०-८०	७०-८०	तराईको सिंचित क्षेत्र

(ज) गाजर

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	नानटिस फोर्टे	२०४६ (१९९०)	९०-१००	१२.०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२	न्यु कुरोदा, (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	१००	५०-६०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
३	नेपा ड्रिम , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१२०	२५	तराई र पहाड
४	सिरमा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१२०	२५	तराई र पहाड
५	कुरोदा मार्क II, F ₁ , (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	५-७	मध्य पहाड र तराई
६	मस्काडे, F ₁ , (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५५-६० ५५	७०-१००	मध्य पहाड र तराई

(झ) बन्दा

५५

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कोपनहेगन मार्केट	२०५१ (१९९४)	७०-९०	३५	तराई र मध्यपहाड
२	नेपा ग्रिन ७७७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८५-९०	७५	तराई तथा मध्य पहाड
३	विगसन १७१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९५-१००	८०	उच्च पहाड
४	नेपा राउण्ड, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०	७५	तराई
५	सुपर ग्रिन, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०-१००	४०-५०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
६	रेयर बल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०	३६-४०	तराई, पहाड र उच्च पहाड

७	ग्रिन कोरोनेट, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	३५-३८	तराई र पहाड
८	सुपर कोरोनेट, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	३२-३५	तराई र पहाड
९	नेपा स्टार, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	२२-२५	तराई र पहाड
१०	टि ६२१ , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५५-६०	१८-२०	तराई र पहाड
११	समर क्स, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५३-५८	४५-६०	तराई र पहाड
१२	ग्रिन च्यालेन्जर, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	४५-६०	तराई र पहाड
१३	ग्रिन हिरो, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५३-५८	४५-६०	तराई र पहाड
१४	नेपा म्याजिक, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	४५-६०	तराई र पहाड
१५	बोनस, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८०-८५	६०-७०	तराई र पहाड
१६	गोल्डेन बल, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५३	४५-६०	तराई र पहाड
१७	क्षितिज, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५३-५८	४५-६०	तराई र पहाड
१८	ऋषि, F ₁ पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	४५-६०	तराई र पहाड
१९	ग्रीन काउन, F ₁ -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	७५-८०	२०-२५	मध्य पहाड
२०	ग्रीन टप, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	११०	४८	मध्य पहाड र तराई
२१	एन एस आर, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	१००	४२	मध्य पहाड र तराई
२२	के एफ ६५, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९५	३९.२	मध्य पहाड र तराई
२३	एन ७६६, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	१००	४८	मध्य पहाड र तराई
२४	एन वाई सि आर , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	१०० ५६	४८	मध्य पहाड
२५	ग्रीन हट, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	० ५६	५०-६०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२६	वाई आर होनाम, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	.. .०	५०-६०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
२७	एशिया एक्स्प्रेस, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५५	४०-५०	तराई र मध्य पहाड
२८	सि.जे.एन.-१२, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	७५-८०	४९.३	तराई,भित्रि मधेश र पहाड
२९	एशिया क्स, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	५०-५५	३९.२	तराई,भित्रि मधेश र पहाड

३०	जेनिथ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५५-६५	४०	तराई डबल
३१	फुटोस्की F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	९०	३०-४५	तराई , मध्य पहाड
३२	वन्डर बल F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	९२-९६	७१.७	मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
३३	ग्रीन च्यालेन्जरमन्सान्टोF1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	९२-९६	५६.४१	मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र
३४	मिलेनियम-१११F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	८७	६५-७०	तराईको सिंचित क्षेत्र
३५	सौर्या F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	८६-९७	६०-६७	तराईको सिंचित क्षेत्र

(ज) तनेबोडी

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	खुमल तने	२०५१ (१९९४)	६०-७०	४.५	तराई र मध्यपहाड
२	सर्लाही तने	२०५१ (१९९४)	५०-६०	७.०	तराई र मध्यपहाड
३	चन्द्रा ०४१, (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	४८	३३	तराई र मध्यपहाड
४	कर्मा स्टीक्लेस (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५	१५	तराई र मध्य पहाड
५	एनओ - ३२४ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	४.६	तराई , मध्य पहाड र उच्च पहाड
६	सीला - ४६४ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	३५-४०	५	तराई र मध्य पहाड
७	ग्रेटवाल- ०२(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)		१४.२-२४.६	पहाडी सिंचित र अर्धसिंचित क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका आसपास
८	ग्रेटवाल- ०३(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)		१६.६-३१.४	पहाडी सिंचित र अर्धसिंचित क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका आसपास

(ट) धिउ सिमी

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	विशुली सिमी	२०५९ (१९९४)	७०-७५	१४.०	मध्य र उच्च पहाड
२	झांगे सिमी	२०५९ (१९९४)	५०-५५	९.०	तराई र मध्य पहाड
३	मन्दिर (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	४६	१२	तराई र मध्यपहाड

(ठ) केराऊ

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	सर्लाही आर्केल	२०५९ (१९९४)	६०-६५	५-७	तराई, मध्य र उच्च पहाड
२	न्यू लाईन	२०५९ (१९९४)	८५-९०	६-८	तराई र मध्य पहाड
३	सिक्किमे	२०५९ (१९९४)		२५-३०	तराई, मध्य र उच्च पहाड

(ड) भेडे खुर्सानी

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	क्यालिफोर्निया	२०५९ (१९९४)	८०-९०	१६-२०	तराई, मध्य र उच्च पहाड
२	सागर (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	६५-७५	३६	तराई र मध्यपहाड
३	एन एस ६३२, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५	४४-५०	तराई र पहाड

(ढ) खुर्सानी

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ज्वाला	२०५९ (१९९४)	६०-७०	२५-३०	तराई, मध्य र उच्च पहाड
२	कर्मा ७४७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०	४०	तराई र मध्यपहाड

३	कर्मा ७७७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५	६०	तराई र पहाड
४	नेपा हट, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९२०	४०	तराई र मध्यपहाड
५	अन्ना ३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-७५	४०-४४	तराई र पहाड
६	एन एस १७०१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८५	८०-९०	तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरु
७	एन एस ११०१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-८०	७०-७४	तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरु
८	गोली, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-८०	७०-७६	तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरु
९	आकास, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८५	५०-५६	तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरु
१०	बिग मामा ३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९५	५०	तराई र पहाड
११	ओमेगा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	११५	५०	तराई र पहाड
१२	सुपर तारा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	११८	४०	तराई र पहाड
१३	मार्शल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	११५	३५	तराई र पहाड
१४	सुद्र (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	६५	४९. ३	तराई, भित्रि मधेश र पहाड
१५	प्रिमियम F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	८०-८५	२५-३०	तराई र मध्य पहाड
१६	नैना, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	८०	४०-५०	तराई र मध्य पहाड
१७	फाएर क्याम्प(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	९४४	१२-१४	तराईको सिंचित क्षेत्र
१८	हट सट (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	९४४	१३-१५	तराईको सिंचित क्षेत्र

(ण) भण्टा

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	नुकी	२०५१ (१९९४)	६०-६५	२५-३०	तराई र मध्य पहाड
२	एन एस ७९७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५५-६०	३०-४०	तराई र मध्यपहाडका नदी किनारहरु

३	अर्का केशव (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	७०-७५	२०-२४	तराई र मध्यपहाड़का नदी किनारहरु
४	अन्ना ८०६, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६४	४०-४५	तराई र मध्यपहाड़का नदी किनारहरु
५	रुनाको, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७(२०१०)	६०-७०	१०	तराई, पहाड़ र उच्च पहाड़
६	मायालु - ५५५ F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	७५	४५	तराई र मध्य पहाड़
७	साम्ली F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५-५०	५०	तराई
८	आशा F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	६०-७०	तराई र मध्य पहाड़

(त) घिरौला

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कान्तिपुर	२०५१ (१९९४)	११०-१२०	१५-१८	मध्य पहाड़
२	न्यु नारायणी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५	१३	तराई र मध्यपहाड़का
३	गिता, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०	३८	तराई र मध्यपहाड़का
४	एन एस ४४५, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	२४-३६	तराई र मध्यपहाड़
५	एन एस ४४१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	२०-३०	तराई र मध्यपहाड़
६	निशा-७७७F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५	४०	तराई र मध्यपहाड़
७	सरिताF ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५-५०	५०-७०	तराई
८	सिन्धुF ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५०-६०	५०-७०	तराई

(थ) काँको

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कुशले	२०५१ (१९९४)	७५-८०	१५-१८	तराई र मध्य पहाड़
२	एन एस ४०४, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३०-३५	२.४-३.२	तराई र पहाड़
३	एन एस ४०८, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४३-४५	४	तराई र पहाड़

४	चाँदनी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३६	५८	मध्यपहाड
५	सिमरन, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६३	मध्यपहाड
६	मलिका ९९९, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३७	५८	तराई
७	कोपिला, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६५	तराई र मध्यपहाड
८	कर्मा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६३	तराई र मध्यपहाड
९	गौरी ७५७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६३	तराई र मध्यपहाड
१०	हिमाल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-३७	६०	मध्यपहाड
११	गरिमा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५-४८	५५	तराई र मध्यपहाड
१२	मनिषा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६०	मध्यपहाड
१३	सन्जय, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-३७	६१	मध्यपहाड
१४	सालिनि, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३६-४६	५४	तराई र मध्यपहाड
१५	सिता ८८८, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३४	६६	मध्यपहाड
१६	रमिता, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-३८	६३	मध्यपहाड
१७	पार्वती ४७८, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६०	मध्यपहाड
१८	शाहिनी १, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३६	६८	तराई
१९	शाहिनी २, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३७	६८	तराई
२०	निन्जा १७९, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	६३	तराई र मध्यपहाड
२१	नेपा टुसी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	१५-१८	तराई र पहाड
२२	नेपा टुसी १०३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	१८-२०	तराई र पहाड
२३	डयाडी २२३१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	३०-४०	तराई र पहाड
२४	लक्की स्टार, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	३०-४०	तराई र पहाड
२५	डाइनेस्टी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४२	४०-६०	तराई र पहाड
२६	बेली F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०	५०-७०	तराई र पहाड
२७	स्याजेस्टी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०	५०-७०	तराई र पहाड

२८	हिमालय, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४५	६३.७	मध्य पहाड र तराई
२९	हिरो, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४७	७०	तराई
३०	जुवोराज ४११, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४५	७६.५	मध्य पहाड र तराई
३१	कानेना, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	३५-४०	१५-२०	मध्य पहाड र तराई
३२	कासिन्दा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	३५-३८	१५-२०	मध्य पहाड र तराई
३३	एल. - ३३३ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६९ (२०१२)	५२	२७.१	तराई भित्री मधेस र पहाड
३४	राजा F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५	६५	तराई
३५	मालिनी F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४३-४५	४५-४८	तराई
३६	एनओ- १२९ F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५५	३२	तराई र मध्य पहाड
३७	भक्तपुर लोकल (दर्ता)	२०७५ (२०१८)	६०-६५	३०-३५	६०० देखि १६०० मिटर उचाई सम्म।

(द) स्वास फर्सी

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	असारे स्वास	२०५१ (१९९४)	६०-८०	९७.८	तराई र मध्य पहाड
२	अन्ना १०१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५-७०	४०-५०	तराई र पहाड
३	अन्ना २०२, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५-७०	३६-४०	तराई र पहाड
४	अन्ना ३०३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६५-७०	४०	तराई र पहाड
५	सनी हाउस, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०-५२	५१.८	तराई र पहाड
६	टुरु ग्रीन, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३८-४३	२९	तराई र पहाड
७	सोन्डो भि, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३८-४३	२५	तराई र पहाड
८	लड़ ग्रीन, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५३-५८	२५	तराई र पहाड
९	हनि डेजर्ट, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०-९५	१८	तराई र पहाड
१०	डेभिन्च -पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०-७५	१०५	मध्य पहाड र तराई
११	स्टार व आई जुकिनी (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०-५५	११०	मध्य पहाड र तराई

१२	ग्रे जुकिनि (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५	८०	तराई र मध्य पहाड
१३	सुपर स्वास बल (पञ्जीकरण मात्र)	२०७५(२०१८)	४०-४५	२८-३१	मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र ।

(ध) स्वीस चार्ड

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	सुसाग	२०५१ (१९९४)	६०-७०	२०-३५	तराई, मध्य र उच्च पहाड

(न) तीते करेला

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	हरियो करेला	२०५१ (१९९४)	९०-१००	२०-२५	तराई र मध्य पहाड
२	चन्द्रा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५०	१९.८	तराई र मध्यपहाड
३	लक्ष्मी ५५५, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०	२८	तराई ,मध्यपहाड तथा उच्च पहाड
४	पिपल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०	२०.९	तराई ,मध्यपहाड तथा उच्च पहाड
५	शिव, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५०	२१.४	तराई
६	सेती ४४४, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४६-४८	२६.९	तराई ,मध्यपहाड तथा उच्च पहाड
७	कोमल F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५०	३५.६	तराई ,मध्यपहाड तथा उच्च पहाड
८	गंगा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	२४	तराई
९	सम्बृद्धि, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५०	३५.८	तराई ,मध्यपहाड तथा उच्च पहाड
१०	हिरा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४८-५०	२४.३	तराई
११	एन एस ४५३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४०-४५	तराई र पहाड
१२	एन एस ४५४, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४०-४५	तराई र पहाड
१३	एन एस १०२४, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४०-४५	तराई र पहाड
१४	एन एस ४३१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४०-४५	तराई र पहाड

१५	एन एस ४३३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४०-४५	तराई र पहाड
१६	एन एस ४३४, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	४४-४८	तराई र पहाड
१७	पाली, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४०-५०	४५-५०	तराई, पहाड र उच्च पहाड
१८	केशव -७७७F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५०	२८.५	तराई र मध्य पहाड
१९	हरीत F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-७०	३०-३५	तराई र मध्य पहाड
२०	रमन F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६०-६५	३५-४०	तराई
२१	माया F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५	४०-४५	तराई र मध्य पहाड
२२	सि.जी. ०१ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७५(२०१८)	८० -९९	१८-२२	पूर्वी तराई
२३	सि.जी. ०२ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७५(२०१८)	८०-९९	१५-१९	पूर्वी तराई

(प) रामतोरिया

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	पार्वती	२०५१ (१९९४)	५०-६०	१२-१६	तराई, मध्य र उच्च पहाड
२	अर्का अनामिकाOP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	२४-३२	तराई , मध्यपहाड र उच्च पहाड
३	जया F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५-५०	१३-२०	तराई

(फ) पालुङ्गो

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	हरिपाते	२०५१ (१९९४)	४०-४५	१२-१६	तराई, मध्य र उच्च पहाड
२	डब्लु किड, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	१२०	१८-२७	तराई , र पहाड
३	एशिया डोड चो, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०-६०	१०-१८	मध्य पहाड र तराई
४	एशिया वोल डोड, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	५०	१०-१८	मध्य पहाड र तराई
५	पाटने पालुङ्गो (पञ्जीकरण मात्र)	२०७४ (२०१८)	५०-५५	१६.६०	समुन्द्र सतहदेखि २१०० मिटर उचाईसम्मका तराई, पहाड र

					उच्च पहाड
--	--	--	--	--	-----------

(ब) ब्रो काउली

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ग्रीन डोम ११५, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	११५	२०-२४	तराई, पहाड, उच्च पहाड
२	ग्रीन डोम ८०, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८०	१८-२४	तराई, मध्य पहाड, उच्च पहाड
३	ग्रीन पारासोल F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७३	३०-३२	तराई, पहाड
४	प्रिमियम कप, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	२१-२३	तराई, पहाड
५	सेन्ताउरो, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६८	२२-२५	तराई, पहाड
६	ग्रीन पिया, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८५	१६-१७	तराई, पहाड
७	साकुरा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९५	१०-१२	मध्य पहाड
८	एभरेष्ट ग्रीन, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	९५	२५-३०	तराई र मध्य पहाड
९	किड डोम, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	८५-९०	१६-२४	तराई र मध्य पहाड
१०	अर्ली यु, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-६५	१२-१८	तराई र मध्य पहाड
११	नोक गक, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	८५-९०	१६-२४	तराई र मध्य पहाड

(भ) तर्बुजा

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	लक्ष्मी ७४७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७०-७५	२०.५	तराई
२	लक्ष्मी ७६७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	३०.५	तराई
३	मस्ताना F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	६५-७०	७०-८०	तराई

(म) फर्सि

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	सोनार ०२२, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	७५-८०	५५	तराई

(य) लौका

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	काभेरी, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५-५०	४०-५०	तराई र पहाड
२	एन एस ४२९, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५-५०	४४-५६	तराई र पहाड
३	एन एस ४४३, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४३-५०	३०-४०	तराई र पहाड
४	अनमोल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०	१२	तराई, पहाड र उच्च पहाड
५	धारा, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५५-६५	५०-७०	तराई तथा पहाड

(र) पाटे घिराँला

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	ह्यु क्यु ५०१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०	२३	तराईर मध्यपहाड
२	एन एस ४०१, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	४४-४८	तराई र पहाड
३	भिसेट सि सि १६५F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५-४०	३०	तराई र मध्यपहाड

(ल) धनिया

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हें)	सिफारिस क्षेत्र
१	लोटस OP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	११.८	तराई ,र मध्यपहाड
२	सुरभी OP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	३५	१६-२०	तराई , मध्यपहाड र उच्च पहाड
३	अमेरिकन लङ्ग स्ट्यान्डीड (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	४५-५०	१२.२	तराई र मध्य पहाड

४	एक्स एम एल एनओ -४६५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	३५	७.२	तराई , मध्य पहाड र उच्च पहाड
५	रामसेस F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	५०-६०	६-७	तराई र मध्य पहाड

व) चिचिण्डा

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कर्णाली, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५	३०	तराई र मध्यपहाड
२	हरियाली , F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०	३०	तराई र मध्यपहाड

(श) कुरिलो

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	मेरी वाशिडटन ५०० डब्ल्यु, OP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	२१०	६	तराई , मध्यपहाड र उच्च पहाड

(ष) पासले

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	पासले ग्रीन कारपेट(पञ्जीकरण मात्र)OP	२०६६ (२०१०)	६०-६५	१	तराई , र पहाड
२	सोइ सिम (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६६ (२०१०)	६०-६५	२	तराई , र पहाड

३	सेलेरी उताह टल ग्रीन (पञ्जीकरण मात्र)OP	२०६६ (२०१०)	७०-८०	१	तराई , र पहाड
---	---	-------------	-------	---	---------------

(स) ग्र्यांठकोपी

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	नेपा बल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-५०	१५	तराई , र पहाड
२	समाटOP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६०	१५	मध्य पहाड

(ह) पाकचोय

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	टेष्टी ग्रीन F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४५-५०	४८-५७	तराई र पहाड
२	चोको OP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	४०-५०	२	तराई र मध्य पहाड
३	क्यनटोड ट्वाइट (पञ्जीकरण मात्र) OP	२०६७ (२०१०)	४०-५०	२	तराई र मध्य पहाड
४	एनओ –४९६ F1(पञ्जीकरण मात्र)	२०७० (२०१३)	२५०	१६	तराई तथा पहाड

(क्ष) जिरीको साग

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ग्रीन स्पान, OP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०-५५	४-५	तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाड
२	ग्रीन बेमOP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	४०-४५	१	तराई र मध्यपहाड तथा नदी किनारहरु
३	न्यु रेड फायरOP (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५०-५५	१	तराई र मध्यपहाड तथा नदी किनारहरु

(न) चुकन्दर

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	मधुर OP(पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	६०-७०	२४-३६	तराई र पहाड

(ज्ञ) चाईनिज बन्दा

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ब्लुज, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	५५-६०	२२-२५	तराई र पहाड
२	विन्टर भिजिटर, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९०	९०-११०	तराई र पहाड
३	स्प्रिंग सन - ६०(पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	७५-८०	२०-२५	मध्य पहाड
४	एन ७, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६६ (२०१०)	९५	४२	तराई र मध्य पहाड
५	सि आर चुन दे गिल, F ₁ (पञ्जीकरण मात्र)	२०६७ (२०१०)	६५-७०	४०-५०	तराईर मध्य पहाड

ज्ञ१) चम्सुर

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	ठिमी चम्सुर(पञ्जीकरण मात्र)	२०७४ (२०१८)	४५-५०	८	समुद्र सतहदेखि १२०० मिटर उचाईसम्मको तराई, मध्य र उच्च पहाड

ज्ञ२) लट्टे

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	रामेछाप हरियो(पञ्जीकरण मात्र)	२०७५ (२०१८)		८-१८	२०० देखि १६५० मिटर उचाईसम्मको असिंचित क्षेत्र

ज्ञ३) सिमी

क्र स.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	लङ्ग ग्रीन बिन(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	७५-७८	२६-२८	मध्य पहाड
२	सेमी लाइट लङ्ग (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६ (२०१९)	७०-७५	३०-३३	मध्य पहाड

६. घाँसे बाली

(क) जै

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कामधेनु जै	२०६९ (२००४)	२०६	५१-७५	तराई र मध्य पहाड
२	नेत्र जै	२०६९ (२००४)	१९७	३२-९१	तराई र मध्य पहाड
३	गणेश	२०६९ (२०१२)	२१७	४८-५०	तराई देखि मध्य पहाड
४	पार्वती	२०६९ (२०१२)	२०७	६१-७०	तराई देखि उच्च पहाड
५	अमृतधारा	२०७२ (२०१५)	१८०-१९०	३६	तराईदेखि मध्य पहाड
६	नन्दिनी	२०७२ (२०१५)	१३९-१९०	३२-३८	तराई र भित्री मधेस
७	स्वान(पञ्चिकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१७०-१७५	३०-३५	समुन्द्र सतहबाट २००० मिटर उचाई सम्मको तराई ,मध्य र उच्च पहाड

(ख) सेतो क्लोभर

क्र.सं.	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	प्याउली सेतो क्लोभर	२०६९ (२०१२)	२२२	३०-४५	मध्य पहाड देखि उच्च पहाड

(ग) बर्सिम

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	बर्सिम ग्रीन गोल्ड	२०७२ (२०१५)	२७६-२८४	७२-७८	तराई र भित्री मधेस
२	मेसकाभी(पञ्चिकरण मात्र)	२०७३(२०१७)	१६०-१७०	७५-८५	समुन्द्र सतहबाट १२०० मिटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड

(घ) राईघाँस

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र

१	धुन्चे राईघाँस	२०७२ (२०१५)	२७६-२८४	३०-४०	मध्य तथा उच्च पहाड
---	----------------	-------------	---------	-------	--------------------

(ड) टियोसेन्टी

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	मैकेचरी१	२०७३(२०१७)	११५-१२५	३५-४५	समुन्द्र सतहबाट १५०० मिटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड

(च) कमन भेच

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाक्ने दिन	उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)	सिफारिस क्षेत्र
१	कुटिल कोसा १	२०७३(२०१७)	१६३-१७०	३५-४०	समुन्द्र सतहबाट २००० मिटर उचाई सम्मको तराई मध्य र उच्च पहाड

(छ) स्टाईलो

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष			सिफारिस क्षेत्र
१	पाल्पा स्टाईलो	२०७३(२०१७)	११५-१२५	७२-८०	समुन्द्र सतहबाट १६०० मिटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड

(ज) कक्सफुट

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष			सिफारिस क्षेत्र
१	रसुवा कक्सफुट	२०७३(२०१७)	२९६-३००	३०-४०	समुन्द्र सतहबाट १२०० देखि ४००० मिटर उचाई सम्मको मध्य पहाड र उच्च पहाड

(झ) नेपियर

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष			सिफारिस क्षेत्र

१	हाती घाँस१	२०७३ (२०१७)	१२०-१३०	६०-८०	समुन्द्र सतहबाट १५०० मिटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड
---	------------	-------------	---------	-------	--

(ज) सेटारिया

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष			सिफारिस क्षेत्र
१	खुमल बन्सो	२०७३(२०१७)	१२०-१३०	६०-८०	समुन्द्र सतहबाट २००० मिटर उचाई सम्मको तराई मध्य र उच्च पहाड

७. फलफूल बाली

(क) कागती

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	फल शुरु हुने समय	उत्पादन	सिफारिस क्षेत्र
१	सुन कागती १	२०७२ (२०१५)	३ वर्षमा फल्छ	३४.५	तराई र भित्री मधेस तथा मध्य पहाडको खोच वेशीको पानी नजम्ने क्षेत्र
२	सुन कागती २	२०७२ (२०१५)	३ वर्षमा फल्छ	२६.९	तराई र भित्री मधेस तथा मध्य पहाडको खोच वेशीको पानी नजम्ने क्षेत्र
३	तेव्युम स्थानिय	२०७५ (२०१८)		१५	पूर्वी पहाडको १००० देखि १६०० मिटर सम्मको तुसारो नपर्ने क्षेत्र

(ख) सुन्तला

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	फल शुरु हुने समय	उत्पादन	सिफारिस क्षेत्र
१	खोकु स्थानीय (दर्ता)	२०७५ (२०१८)		१६-२४	पूर्वी पहाडको १००० देखि १६०० मिटर सम्मको तुसारो नपर्ने क्षेत्र

(ग) केरा

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	फल लिने समय	उत्पादन	सिफारिस क्षेत्र
१	जि ९(पञ्जीकरण मात्र)	२०७६(२०१९)	१५ – १६ महिना	५०-५५	समुद्र सतहदेखि ७०० मिटर सम्मको उचाइको तराई र नदी किनार
२	विलियम हाइब्रिड (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६(२०१९)	१४ – १५ महिना	४०-५०	समुद्र सतहदेखि ७०० मिटर सम्मको उचाइको तराई र नदी किनार
३	मालभोग स्थानीय (पञ्जीकरण मात्र)	२०७६(२०१९)	१४ महिना	१५-२०	समुद्र सतहदेखि १२०० मिटर सम्मको उचाइको तराई, नदी किनार र होचा पहाडी उपत्यकासम्म

७. कन्दमूल बाली

(क) सखरखण्ड

क्र. सं	बालीको जात	सिफारिस वर्ष	पाकने समय	उत्पादन	सिफारिस क्षेत्र
१	सुन्तले सखरखण्ड १	२०७६(२०१९)	१३०-१५०	१२.९१	तराई, भित्री मधेस र मध्य पहाड
२	सुन्तले सखरखण्ड २	२०७६(२०१९)	१३०-१५०	२०.८	तराई, भित्री मधेस र मध्य पहाड

स्रोत: बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर, २०७६।